

## **PROSPECTO:**

### **FLUOCID FORTE**

**Fluocinolona**

**CREMA**

**COMPOSICIÓN POR 100 G:** Fluocinolona acetónido 0,2 g.

Excipientes: Polietilenglicol 4000, Alcohol cetílico, Glicerina, lauril sulfato sódico, Agua desmineralizada.

**PROPIEDADES:** La Fluocinolona acetónido es un glucocorticoide sintético de aplicación tópica y de gran potencia, que está indicado en el tratamiento de las enfermedades de la piel agudas y crónicas de diferente origen , especialmente las resistentes a los corticoides habituales.

**INDICACIONES:** Terapéutica local de afecciones cutáneas con fondo alérgico inflamatorio o pruriginoso, resistentes a concentraciones menores de Fluocinolona acetónido y a otros corticoides: dermatitis de contacto, dermatitis seborréica, neurodermatitis, lupus eritematoso, psoriasis pustular, necrobiosis lipoidica, granulación anular, mixedema pretibial, etc.

### **POSOLOGIA:**

Se aplica una pequeña cantidad de crema y se extiende sobre el área afectada, dos o tres veces al día. La dosis puede ser gradualmente reducida hasta completa suspensión, cuando el paciente presente una mejoría satisfactoria.

### **NORMAS PARA LA CORREFTA ADMINISTRACIÓN:**

Se recomienda extender una pequeña cantidad sobre la superficie afectada, seguida de una ligera fricción para facilitar la penetración del medicamento. En algunos casos puede ser recomendable la aplicación de compresas húmedas calientes para conseguir mayor efecto terapéutico. Cuando el médico indique su empleo en cura oclusiva no deberá sobrepasarse la dosis de 2 g de crema al día.

### **CONTRAINDICACIONES:**

Como todos los corticoides tópicos está contraindicado su empleo en afecciones tuberculosas cutáneas, afecciones por virus, lúes, varicela, reacción vacunal, micosis e infecciones dermatológicas bacterianas. Debido a la vasoconstricción local que produce el fármaco no es imprudente su empleo en el tratamiento de úlceras de las extremidades inferiores.

**INCOMPATIBILIDAD E INTERACCIONES:** No se conocen en el empleo tópico de Fluocinolona acetónido.

**ADVERTENCIA:** Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de control del dopaje positivo.

**EFFECTOS SECUNDARIOS:** No se han puesto de manifiesto efectos secundarios en el empleo tópico de la Fluocinolona acetónido. De todos modos en las curas oclusivas

sobre las áreas cutáneas extensas es posible una discreta absorción transcutánea del corticosteroide que debe ser tenida en cuenta.

**INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO:**

Los riesgos de toxicidad en el tratamiento tópico con Fluocinolona acetónido, dentro de las concentraciones tan bajas usadas, y la forma de aplicación recomendada son prácticamente nulos. En algún caso de tratamiento muy prolongado con curas oclusivas que se observan algún síntoma propio del uso de los corticoides, bastará con reducir o suspender el tratamiento.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica: Teléfono (91) 5620420.

**PRESENTACIÓN:** Tubos con 15, 30 y 60 g de crema de acetonido de Fluocinolona al 0,2%.

**CON RECETA MEDICA**

**Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.**