

Brentán®

Composición

Cada gramo contiene:

Nitrato de miconazol (D.C.I.) 20 mg

Hidrocortisona (D.C.I.) 10 mg

Excipientes: Palmitoestearato de etilenglicol y polioxietilenglicol, glicéridos oleicos polioxietilenados, vaselina líquida, perfume, ácido benzoico, edetato disódico, butilhidroxianisol, agua purificada.

Propiedades

La necesidad de asociar un antimicótico de amplio espectro como el Miconazol, activo frente a dermatofitos, levaduras y gérmenes gram-positivos, con un antiinflamatorio clásico como la Hidrocortisona, obedece a la frecuencia con que las micosis, por diversas causas, presentan una sintomatología inflamatoria y alérgica sobreañadida.

Indicaciones

Epidermomicosis y tiñas superficiales e intertriginosas, acompañadas de inflamación o eczematizadas. Pie de atleta, micosis producidas por levaduras, pitiriasis versicolor, sobre todo en las formas inflamatorias o eczematizadas.

Posología

Aplicarse la crema sobre la superficie afectada una o dos veces al día y friccionarse hasta hacer penetrar la crema en la piel.

Duración del tratamiento: 2 a 5 semanas.

Contraindicaciones

Afecciones cutáneas tuberculosas, herpes, vacuna y varicela.

Advertencia

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de control del dopaje como positivo.

Advertencias sobre excipientes

Por contener ácido benzoico como excipiente puede irritar ligeramente los ojos, la piel y las mucosas. Puede aumentar el

riesgo de coloración amarillenta de la piel (ictericia) en recién nacidos. Por contener butilhidroxianisol como excipiente puede ser irritante de ojos, piel y mucosas.

Precauciones

Se aplicará con prudencia en las embarazadas y lactantes si es necesario aplicarla sobre extensas superficies o en cura oclusiva.

Interacciones

No se han descrito.

Efectos secundarios

No se han registrado acciones irritativas o reacciones alérgicas cutáneas con la aplicación tópica de BRENTAN.

La forma de crema se tolera bien y puede utilizarse incluso en áreas húmedas intertriginosas.

Intoxicación y su tratamiento

En la práctica es muy improbable que en la administración por vía tópica de BRENTAN se produzcan intoxicaciones. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

Presentación

Tubo con 30 g de crema.

Condiciones de almacenamiento y conservación

Conservar en nevera entre 2° C y 8° C. Una vez desprecintado el tubo y mientras se esté utilizando, puede conservarse a temperatura ambiente durante un período corto de 3-4 semanas.

Con receta médica

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños

EA0799 - 01 - 0 - Ag

ESTEVE

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221 - 08041 Barcelona