

PENILEVEL
Penicilina "G" sódica

COMPOSICIÓN:

PENILEVEL 600.000U.I. 1.000.000U.I. 2.000.000U.I. 5.000.000U.I. 10.000.000U.I.

Contenido por unidad:

Penicilina "G" sódica 600.000U.I. 1.000.000U.I. 2.000.000U.I. 5.000.000U.I. 10.000.000U.I.

Excipiente: agua para inyección.

INDICACIONES:

Infecciones producidas por microorganismos gram-positivos tales como: Neumonía, pleuritis y meningitis por neumococos.

Amigdalitis, faringitis, anginas, otitis media, sinusitis aguda, escarlatina, neumonía, absceso pulmonar, fiebre puerperal, septicemia y endocarditis por estreptococos.

Bronconeumonía, osteomielitis, septicemia, empiema, absceso pulmonar, enterecolitis aguda, aborto séptico, endocarditis subaguda y meningitis por estafilococos no productores de penicilinasa..

Gonorrea y sus complicaciones genitourinarias por gonococos.

Meningitis meningococica, grangena gaseosa, difteria y tétanos.

Estomatitis y angina de Vincent producidas por espiroquetas, actinomicosis producida por actinomicetos y sífilis producida por Treponema pallidum..

Como profiláctico en indicaciones perfectamente establecidas.

POSOLOGÍA:

La dosificación y cadencia debe ser impuesta siempre por el medico, que valorara la gravedad del proceso a tratar y la vía de administración; intramuscular, endovenosa o añadiéndola a soluciones intravenosas para infusión gota a gota.

ADULTOS: En general por vía intramuscular:

La dosis terapéutica usual es 1.000.000 de U.I. cada 6 horas.

Por vía intravenosa:

La dosis terapéutica usual es 1.000.000 de U.I. cada 4 horas

En suero fisiológico para infusión gota a gota:

La dosis terapéutica usual es 10-100 millones de U.I. diarios.

NIÑOS: La dosis variará en función de la edad y peso corporal. En general la dosis usual se calculará considerando que las dosis anteriores son para adulto de 60 Kg

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO

PENILEVEL puede administrarse por vía intramuscular o por vía intravenosa ya sea directamente o mediante dilución en sueros de goteo.

Para la administración de PENILEVEL por vía intravenosa es conveniente ajustar la concentración del inyectable hasta 1.000.000 de U.I. por cada 4 ml. Diluyendo si es preciso con agua para inyección estéril y apirógena, e inyectar lentamente.

Para la administración de PENILEVEL en sueros de goteo la dilución más correcta es de hasta 10.000.000 de U.I. cada 100 ml de suero fisiológico.

NOTA: La solución de PENILEVEL permite llegar a concentraciones del orden de 1.000.000 de U.I. por ml.

CONTRAINDICACIONES

Personas alérgicas a las penicilinas.

PRECAUCIONES

Debe administrarse con precaución en pacientes alérgicos a las cefalosporinas y en aquellos con historial alérgico anterior fundamentalmente medicamentoso.

INCOMPATIBILIDADES

Antibióticos bacteriostáticos.

INTERACCIONES

La penicilina G sódica se inactiva en suero glucosado.

EFECTOS SECUNDARIOS

Reacciones de hipersensibilidad por urticaria, edema angioneurótico, ataque asmático y shock anafiláctico.

Al cabo de unos días puede producir erupciones y fiebre e incluso leucopenia, púrpura y neutropenia.
Reacción de Herxheimer.

Dolor, induración o trastornos nerviosos periféricos por vía intramuscular.

A dosis elevadas y por vía intravenosa puede producir irritación del S.N.C.

INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO

Dado que la toxicidad de PENILEVEL es extremadamente baja, es muy improbable que se produzca un cuadro de intoxicación por administración excesiva, en cuyo caso se aplicaría tratamiento sintomático.

En el caso de aparecer síntomas de alergia medicamentosa (urticaria, edema angioneurótico, ataque asmático o incluso shock anafiláctico), se recomienda el tratamiento con corticoides solubles, adrenalina al milésimo, aminofilina y antihistamínicos.

En el caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562.04.20.

PRESENTACIONES

		Nº Reg.
PENILEVEL	600.000 U.I con una ampolla de 4 ml de agua para inyección	E.N. 33.579
PENILEVEL	1.000.000 U.I con una ampolla de 4 ml de agua para inyección	E.N. 33.580
PENILEVEL	2.000.000 U.I con una ampolla de 4 ml de agua para inyección	43.504
PENILEVEL	5.000.000 U.I con una ampolla de 10 ml de agua para inyección	41.245
PENILEVEL	10.000.000 U.I con una ampolla de 10 ml de agua para inyección	48.882

CON RECETA MEDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

LABORATORIOS ERN, S.A.
Calle Pedro IV, 499, 08020 Barcelona