

PENILEVEL RETARD
1.000.000 U.I.

COMPOSICIÓN:

Fórmula por unidad:

Bencilpenicilina sódica 600.000 U.I.
Bencilpenicilina benzatina 200.000 U.I.
Fenoximetilpenicilina cálcica 200.000 U.I.
Excipiente: agua para inyección.

INDICACIONES:

Infecciones producidas por microorganismos gram-positivos como: Neumonía, pleuritis y meningitis por neumococos.

Amigdalitis, faringitis, anginas, otitis media, sinusitis aguda, escarlatina, neumonía, absceso pulmonar, fiebre puerperal, septicemia y endocarditis por estreptococos.

Bronconeumonía, osteomielitis, septicemia, empiema, absceso pulmonar, enterocolitis aguda, aborto séptico, endocarditis subaguda y meningitis por estafilococos no productores de penicilinas..

Gonorrea y sus complicaciones genitourinarias por gonococos.

Meningitis meningocócica, grangena gaseosa, difteria y tétanos.

Estomatitis y angina de Vincent producidas por espiroquetas, actinomicosis producida por actinomicetos y sífilis producida por *Treponema pallidum*..

Como profiláctico en indicaciones perfectamente establecidas.

POSOLOGÍA:

La dosificación de Penilevel Retard 1.000.000 U.I., debe realizarse bajo prescripción facultativa, teniendo en cuenta que una dosis de 1.000.000 U.I. proporciona concentraciones bactericidas durante 6 horas e inhibitorias hasta las 24 horas.

Dosis usual: 1 vial cada 24 horas.

Dosificaciones especiales:

Fiebres reumáticas, en el momento del brote, un vial de PENILEVEL RETARD 1.000.000 U.I. cada 12 horas.

Erisipela y escarlatina, un vial de PENILEVEL RETARD 1.000.000 U.I. cada 12 horas.

Sífilis, un vial de PENILEVEL RETARD 1.000.000 U.I. cada 24 horas, durante un mínimo de 8 a 10 días.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO

PENILEVEL RETARD 1.000.000 U.I. debe administrarse exclusivamente por vía intramuscular.

CONTRAINDICACIONES

Personas alérgicas a las penicilinas.

PRECAUCIONES

Debe administrarse con precaución en pacientes alérgicos a las cefalosporinas y en aquellos con historial alérgico anterior fundamentalmente medicamentoso.

INCOMPATIBILIDADES E INTERACCIONES

Antibióticos bacteriostáticos.

EFECTOS SECUNDARIOS

Reacciones de hipersensibilidad por urticaria, edema angioneurótico, ataque asmático y shock anafiláctico.

Al cabo de unos días puede producir erupciones y fiebre e incluso leucopenia, púrpura y neutropenia.

Reacción de Herxheimer.

Dolor, induración o trastornos nerviosos periféricos.

INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO

Dado que la toxicidad de PENILEVEL RETARD 1.000.000 U.I. es extremadamente baja, es muy improbable que se produzca un cuadro de intoxicación por administración excesiva, en cuyo caso se aplicaría tratamiento sintomático.

En el caso de aparecer síntomas de alergia medicamentosa (urticaria, edema angioneurótico, ataque asmático o incluso shock anafiláctico), se recomienda el tratamiento con corticoides solubles, adrenalina al milésimo, aminofilina y antihistamínicos.

En el caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562.04.20.

PRESENTACION

Caja con un vial y una ampolla de 4 ml de agua para inyección.

CON RECETA MEDICA

LOS MEDICAMENTO DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS

LABORATORIOS ERN, S.A.

Calle Pedro IV, 499, 08020 Barcelona