



OXITLD

VIA ORAL

COMPOSICION POR SOBRE:

Principio activo: Goma Guar 4,75 g.
Excipientes: Etilpalmitato y Gelatina.

PROPIEDADES

Fibraguar es una especialidad cuyo principio activo, la Goma Guar, es un polisacárido no absorbible, de cadena larga y elevado peso molecular. La acción de Fibraguar se debe a la propiedad de la Goma Guar de retrasar la absorción de los hidratos de carbono, efecto que produce un control de las concentraciones postprandiales de glucosa en sangre.

INDICACIONES

Tratamiento de la diabetes, como coadyuvante al tratamiento hipoglucemiante habitual (dieta, insulina o antidiabéticos orales).

POSOLOGIA

Inicialmente un sobre diario, con el desayuno. De acuerdo con los resultados se irá aumentando paulatinamente a intervalos semanales hasta una dosis de tres sobres diarios, con las principales comidas.

MODO DE EMPLEO

El contenido de los sobres se tomará siempre con abundante líquido. Jamás deberá ser ingerido en seco.

La forma de administración más idónea es dispersar su contenido en agua (200-250 ml.) y beberlo inmediatamente. También podrá tomarse el contenido en 3 ó 4 cucharadas (sin masificar) ayudando por 1/4 litro de agua o zumo de fruta.

Puede también mezclarse con la comida, bebiendo en este caso, un vaso grande de líquido junto con el alimento.

PRECAUCIONES

Se usará con precaución en pacientes con historial de alteraciones esofágicas o dificultades de deglución.

Durante el tratamiento, y especialmente al comenzar, deberán realizarse determinaciones frecuentes de glucosa en sangre y orina, ajustando adecuadamente el tratamiento hipoglucemiante.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Molestias digestivas (meteorismo, diarreas, náuseas, sensación de plenitud estomacal, etc.) que se minimizan comenzando con una dosis baja y aumentando gradualmente (ver POSOLOGIA).

INTERACCIONES

La Goma Guar forma un gel en el tubo digestivo. Es posible, teóricamente, que impida la absorción de otros medicamentos que se administran simultáneamente por vía oral, pero no existen datos clínicos de interacción. Se ha citado que puede reducir en un 25% la absorción del antidiabético oral gliborclonamida, pero si al comenzar el tratamiento conjunto se ha tomado la precaución de reajustar las dosis de hipoglucemiante según el nivel de glucemia, no parece necesario tomar medidas adicionales con los antidiabéticos orales.

SOBREDOSI

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

PRESENTACION

Fibraguar se presenta en envases conteniendo 30 y 60 sobres monodosis, cada uno con 5 g. de granulada.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CON RECETA MEDICA.

MANTENER EN LUGAR SECO.



LABORATORIO DE APLICACIONES
FARMACODINAMICAS, S.A.

G/8560, 16 - 08025 Barcelona (España)