

Blastoestimulina[®] Óvulos

Composición por óvulo:

Extracto de Centella asiática.....	15 mg
Miconazol nitrato.....	100 mg
Metronidazol.....	300 mg
Neomicina sulfato.....	48,8 mg
Polimixina sulfato.....	4,4 mg
Excipientes (Lactosa, sílice coloidal anhidra, dimetilpolisiloxano y glicéridos semisintéticos sólidos)	

Forma farmacéutica y contenido del envase

Envase de 10 óvulos.

Actividad

Blastoestimulina Óvulos combina la acción protectora y cicatrizante-regeneradora del extracto de Centella asiática, con la eficacia antiinfecciosa del resto de sus componentes, a nivel de la mucosa vulvovaginal.

En efecto, a la acción estimuladora del tejido de granulación y facilitadora de una correcta epitelización, propia del extracto de Centella Asiática, se suman en esta ocasión las propias de la neomicina y la polimixina, que cubren un amplio espectro bacteriano actuando tanto frente a gramnegativos como a grampositivos, así como la antifúngica de miconazol nitrato y la tricomonocida de metronidazol.

Titular y fabricante

Titular: Almirall Prodesfarma, S.A. General Mitre, 151 08022 – Barcelona (España).

Fabricante: Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma, S.L. (Planta de Sant Just Desvern)

c/ Trabajo s/n 08960 Sant Just Desvern-Barcelona (España).

Indicaciones

Toda clase de alteraciones vaginales; vulvitis, vaginitis, cervicovaginitis tanto irritativas como bacterianas, moniliasis, tricomoniasis, leucorreas de cualquier etiología. Y especialmente cuando está lesionada la pared vaginal.

Contraindicaciones

No se presenta ninguna contraindicación de tipo farmacodinámico. No se empleará antes del coito, por dificultar la fecundación.

Interacciones

Lavados vaginales con sustancias alcalinas.

No deben ingerirse bebidas alcohólicas durante el tratamiento, ya que pueden originar una reacción tipo antabus (con dificultades respiratorias, vómitos, sudación, gran hipotensión, visión borrosa y confusión).

El metronidazol es incompatible con el disulfiram. Puede potenciar la acción de la warfarina.

Advertencias

Embarazo

No ha sido establecida la inocuidad en la mujer embarazada, por lo que no debe ser utilizado durante los tres primeros meses de gestación.

Posología

1-2 óvulos diarios al iniciar el tratamiento. Una vez mejorados los síntomas, continuar con la aplicación de un óvulo al día en el momento de acostarse, hasta la resolución total del proceso. Debe emplearse durante 5 a 10 días como mínimo.

Normas para la correcta administración del preparado

Introducción del óvulo por vía vaginal.

Sobredosis y tratamiento

No se produce ninguna sobredosificación con el empleo correcto de estos óvulos.

"En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 915 620 420".

Reacciones adversas

Si no hay sensibilización a algún componente, no se producen reacciones adversas.

Si apareciera alguna reacción adversa no descrita en este apartado, deberá comunicárselo a su médico o farmacéutico.

Caducidad

Antes de utilizar este medicamento debe asegurarse que no se ha sobrepasado la fecha de caducidad que figura en el etiquetado.

Otras presentaciones

Blastoestimulina Polvo al 2%: Envase de 5 gramos

Blastoestimulina Pomada al 1%: Envase de 30 gramos

Envase de 60 gramos

Blastoestimulina Pulverizador al 2%: Envase de 10 gramos

Texto revisado: Diciembre 1998.

Mod. P.04.0 (30/05/02) C16/98

Con receta médica
Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños