


POMADA**POMADA
ANTIBIÓTICA LIADE®****COMPOSICIÓN**

Cada gramo contiene:

Neomicina sulfato, como Neomicina base	3,5 mg
Polimixina B sulfato	4.000 UI
Bacitracina	200 UI

Excipientes: Dióxido de titanio (E-171), trioleato de sorbitano, diacetato de clorhexidina, levomentol, eucaliptol, salicilato de metilo, esencia de siringa, aceite de ricino, parafina sólida, c.s.

PROPIEDADES

La Pomada Antibiótica LIADE posee un amplio espectro antimicrobiano que le confieren sus componentes, antibióticos, de uso preferentemente tópico. Es activa frente a Pseudomonas, organismos gram positivos y negativos y frente a numerosas cepas de Proteus.

INDICACIONES

Está indicado en:

Impétigo. Eczemas infectados. Intértrigo. Foliculitis. Forúnculos. Ectima. Sicosis de la barba. Heridas, erosiones y úlceras cutáneas infectadas.

POSOLOGÍA

Uso tópico.

Salvo criterio médico, 2-3 aplicaciones diarias extendidas en capa fina sobre la lesión.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.

PRECAUCIONES

No aplicar en los ojos ni en el canal del oído externo cuando exista perforación del tímpano.

INCOMPATIBILIDADES

No se han descrito.

INTERACCIONES

No se han descrito.

EFEKTOS SECUNDARIOS

Raramente puede aparecer una erupción cutánea por sensibilización alérgica a alguno de los componentes.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

No se prevé su posibilidad.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

PRESENTACIÓN

Tubo de 15 y 30 gramos.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Se conservará tanto mejor cuanto más fresco sea el lugar donde se almacene, por lo que recomendamos no se sobrepongan los 25°C.

CON RECETA MÉDICA.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE
FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS.**

LABORATORIO FARMACEUTICO SIT srl Via Cavour, 70 - Mede (PV) - Italia