

# **virexen 40%**

**Idoxuridina  
Uso tópico**

## **COMPOSICIÓN**

Idoxuridina (DCI) ..... 400 mg  
Dimetilsulfóxido (DCI), ..... c.s.p. 1 ml

## **INDICACIONES**

Todas las manifestaciones cutáneas del virus zóster (“zona”) localizado.

## **POSOLOGÍA**

Se aplica pincelando con el pincel las lesiones vesiculares 3 ó 4 veces al día, durante 4 días. Una vez hecha la aplicación, enjuagar el pincel con agua. Los mejores resultados se obtienen cuando la aplicación se inicia antes o alrededor de las 48 horas siguientes a la aparición de las vesículas.

## **NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN**

El producto se absorbe con mucha rapidez de forma que, una vez la zona tratada aparezca seca, el enfermo puede vestirse sin dificultades. Sin embargo, es recomendable no usar vestidos de fibras sintéticas o tejidos de algodón estampado en contacto con la parte tratada, ya que pueden ser disueltas por el dimetilsulfóxido.

## **CONTRAINDICACIONES**

Alergia conocida a alguno de los componentes de la fórmula. No utilizar en niños menores de 12 años, ni durante el embarazo o la lactancia.

## **PRECAUCIONES**

No aplicar durante más de 4 días, salvo indicación expresa del médico.

Para uso exclusivo en la piel; no aplicar en los ojos, ni en el interior de la boca.

## **INTERACCIONES**

No se han descrito.

## **EFFECTOS SECUNDARIOS**

Esta especialidad deberá aplicarse bajo control médico, siendo aconsejable no utilizarla en forma prolongada para evitar el riesgo de aparición de fenómenos alérgicos.

El dimetilsulfóxido puede provocar, en ciertos casos, reacciones de prurito y eritema transitorios. En otros casos puede ser irritante después de varias aplicaciones. Durante un uso prolongado puede producirse un reblandecimiento de la piel tratada. Estos síntomas desaparecen al terminar el tratamiento.

En caso de aparición de alteraciones epidérmicas (dermatitis), deberá suspenderse el tratamiento.

Después de la aplicación, el paciente puede notar momentáneamente un sabor particular en la boca y un aliento u olor a ajos.

## **INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO**

Una intoxicación por administración local es poco probable. En caso de ingestión accidental del líquido, se aconseja administrar, como antídoto, carbón activado disuelto en agua.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

## **CONDICIONES DE CONSERVACIÓN**

Conservar en ambiente seco.

En lugar fresco se puede solidificar el contenido del frasco. Para licuarlo de nuevo basta introducir el frasco en un baño de agua caliente.

## **PRESENTACIÓN**

Se presenta en frascos de 5 ml dotados de un pincel para su aplicación.

## **CONDICIONES DE DISPENSACIÓN**

Con receta médica.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



Director Técnico, A. Buxadé Viñas  
**Laboratorios Viñas sa**  
Provenza, 386 - 08025 Barcelona