

virexen

Idoxuridina

COMPOSICIÓN

Idoxuridina (DCI)	2%	10%
Dimetilsulfóxido (DCI), c.s.p.	20 mg 1 ml	100 mg 1 ml

INDICACIONES

Todas las manifestaciones cutáneas del herpes simple y del herpes zóster. Acorta la duración de la lesión de 6 a 8 días y, en el caso del herpes zóster, produce la disminución rápida del intenso dolor característico de esta viriasis.

Se consigue también la disminución de las recurrencias.

POSOLOGÍA

Se aplica pincelando las vesículas 3 ó 4 veces al día, durante 4 días. Una vez hecha la aplicación, enjuagar el pincel con agua.

La concentración del 2% se reserva para el herpes simple localizado.

En el herpes zóster se recomienda la concentración del 10%.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

VIREXEN se absorbe con mucha rapidez, de forma que una vez la zona tratada aparezca seca, el enfermo puede vestirse sin dificultades. Sin embargo, es recomendable no usar fibras sintéticas en contacto con la parte tratada, ya que pueden ser disueltas por el dimetilsulfóxido.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

Como la Idoxuridina interviene en la formación del DNA en las células que se dividen activamente, se recomienda no utilizar VIREXEN en mujeres gestantes, a pesar de que las dosis utilizadas son muy pequeñas y de que se usa solamente por vía tópica.

INTERACCIONES

No se han descrito.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Dado que las acciones secundarias del dimetilsulfóxido no están perfectamente determinadas, esta especialidad deberá aplicarse bajo el control médico, siendo aconsejable no utilizarla en forma prolongada para evitar el riesgo de aparición de fenómenos alérgicos.

Debe suspenderse el uso de esta especialidad en caso de aparecer alteraciones epidérmicas o trastornos visuales.

INTOXICACIÓN Y TRATAMIENTO

Dada la dosis contenida en cada frasco, es totalmente imposible la intoxicación con el mismo.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica.

Teléfono (91) 562 04 20.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

En tiempo fresco se puede solidificar el contenido del frasco. Para licuarlo de nuevo basta introducir el frasco en un baño de agua caliente.

PRESENTACIÓN

Se presenta en frascos de 5 ml dotados de un pincel para su aplicación.

Con receta médica

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.



Director Técnico, A. Buxadé Viñas
Laboratorios Viñas sa
Provenza, 386 - 08025 Barcelona