



C/. Aranjuez, Nave 612 - Pol. Ind. ALCALA I
28805 ALCALA DE HENARES (Madrid)
Tels.: 91 882 42 86 - 91 882 45 73
Fax: 91 879 60 24
e-mail: diseno.zurita@telefonica.net



LABORATORIO	FARMASIERRA, S.A.		
PRODUCTO:	TERRAMICINA Pomada tópica		
CODIGO:	13501/11	ANULA AL	13501/10
PAPEL:	offset blanco	GRAMAJE:	50 gr
LAETUS N.º	NO	ESCALA	100%
PANTONES:	294	DIMENSIONES:	105x155 mm
PLANO N.º:		PLEGADO:	105x20 mm
TIPOGRAFIA:	Helvetica (normal, cursiva, bold) Tamaño 8 puntos - Interlínea 9,5 puntos.		

Anverso:

Conforme Laboratorio:



TERRAMICINA®

Oxitetraciclina, polimixina

POMADA TOPICA
(Vía tópica)

COMPOSICION

Cada gramo de pomada contiene:

Oxitetraciclina (hidrocloruro) 30 mg

Polimixina B (sulfato) 10.000 U.

Excipientes: Vaselina líquida; vaselina filante, c.s.

TITULAR Y FABRICANTE

Titular

Farmasierra Laboratorios, S.L.
Ctra. de Irún, km 26,200
28700 San Sebastián de los Reyes (MADRID)

Responsable de la fabricación:

Farmasierra Manufacturing, S.L.
Ctra. de Irún, km 26,200
28700 San Sebastián de los Reyes (MADRID)

INDICACIONES

La TERRAMICINA® POMADA TOPICA está indicada en el tratamiento de las infecciones piógenas superficiales, dermatitis pustular y las infecciones asociadas a las quemaduras y heridas.

DOSIFICACION Y ADMINISTRACION

Después de efectuar una minuciosa limpieza de la zona cutánea afectada, se aplicará suavemente una pequeña cantidad de la pomada. Las aplicaciones deben repetirse 2 ó 3 veces al día. También puede aplicarse la pomada sobre una gasa estéril que luego se coloca sobre la zona afectada.

CONTRAINDICACIONES

La TERRAMICINA® POMADA TOPICA no debe administrarse a sujetos que hayan mostrado sensibilidad a las tetraciclinas.

PRUEBA N.º 1

Fecha: 03/05/04



C/. Aranjuez, Nave 612 - Pol. Ind. ALCALA I
28805 ALCALA DE HENARES (Madrid)
Tels.: 91 882 42 86 - 91 882 45 73
Fax: 91 879 60 24
e-mail: diseno.zurita@telefonica.net



LABORATORIO	FARMASIERRA, S.A.		
PRODUCTO:	TERRAMICINA Pomada tópica		
CODIGO:	13501/11	ANULA AL	13501/10
PAPEL:	offset blanco	GRAMAJE:	50 gr
LAETUS N.º	NO	ESCALA	100%
PANTONES:	294	DIMENSIONES:	105x155 mm
PLANO N.º:		PLEGADO:	105x20 mm
TIPOGRAFIA:	Helvetica (normal, cursiva, bold) Tamaño 8 puntos - Interlínea 9,5 puntos.		

Reverso:

Conforme Laboratorio:

INCOMPATIBILIDADES

No se han descrito.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Se han comunicado reacciones alérgicas debidas a hipersensibilidad individual. No se han descrito otros efectos secundarios. Unicamente existe la posibilidad de sobreinfecciones por gérmenes y/u hongos resistentes. En cualquiera de los casos citados se suspenderá su administración y se aplicará la terapia adecuada en cada caso.

INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO

No se han descrito cuadros tóxicos.
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

PRESENTACIONES

Tubo que contiene 4,7 g de pomada.
Tubo que contiene 14,2 g de pomada.

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

MANTENER PREFERENTEMENTE ENTRE 15 Y 30 °C

CON RECETA MEDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA
DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS

FARMASIERRA LABORATORIOS, S.L.
Carretera de Irún, km 26,200
San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Bajo licencia de PFIZER
13501/11.-Z



PRUEBA N.º 1

Fecha: 03/05/04