



C/ Aranjuez, Nave 612 - Pol. Ind. ALCALA I
28805 ALCALA DE HENARES (Madrid)
Tels.: 91 882 42 86 - 91 882 45 73
Fax: 91 879 60 24
e-mail: diseno.zurita@telefonica.net



LABORATORIO	FARMASIERRA, S.A.		
PRODUCTO:	TERRA-CORTRIL Pomada estéril ótico-oftálmica		
CODIGO:	13282/11	ANULA AL	13282/10
PAPEL:	offset blanco	GRAMAJE:	50 gr
LAETUS N.º	NO	ESCALA	100%
PANTONES:	294	DIMENSIONES:	105x115 mm
PLANO N.º:		PLEGADO:	105x20 mm
TIPOGRAFIA:	Helvetica Condensed (normal, cursiva, bold) Tamaño 7 puntos - Interlínea 7,5 puntos.		

Anverso:

Conforme Laboratorio:



TERRA-CORTRIL®
Oxitetraciclina, hidrocortisona, polimixina

POMADA ESTERIL OTICO-OFTALMICA
(Vía ótico-oftálmica)

COMPOSICION

Cada gramo de pomada contiene:

Oxitetraciclina (hidrocloruro)	5 mg
Hidrocortisona acetato	10 mg
Polimixina B (sulfato)	10.000 U.
Exipientes: Vaselina líquida; vaselina filante.	c.s.

TITULAR Y FABRICANTE

Titular:
Farmasierra Laboratorios, S.L.
Ctra. de Irún, km 26,200
28700 San Sebastián de los Reyes (MADRID)

Responsable de la fabricación:
Farmasierra Manufacturing, S.L.
Ctra. de Irún, km 26,200
28700 San Sebastián de los Reyes (MADRID)

INDICACIONES

Afecciones oculares: Blefaritis aguda y crónica, conjuntivitis no específica, alérgica o flictenular, tanto aguda como crónica, úlcera corneal infectada, queratitis, herpes zoster infectado, iritis, escleritis, etc.

Afecciones óticas: Otitis externa (difusa, alérgica, atópica), impétigo, forunculosis, eczema y otras infecciones localizadas en el oído externo.

DOSIFICACION Y ADMINISTRACION

En las afecciones oculares se aplica directamente del tubo en el saco conjuntival del ojo afectado, más o menos 1,5 cm de la pomada 2 ó 3 veces al día.

En las afecciones óticas se coloca, aproximadamente, 1,5 cm de la pomada sobre un aplicador con algodón o se aplica en el área afectada del oído externo, 3 a 4 veces al día.

PRUEBA N.º 1

Fecha: 03/05/04



C/. Aranjuez, Nave 612 - Pol. Ind. ALCALA I
28805 ALCALA DE HENARES (Madrid)
Tels.: 91 882 42 86 - 91 882 45 73
Fax: 91 879 60 24
e-mail: diseno.zurita@telefonica.net



LABORATORIO	FARMASIERRA, S.A.		
PRODUCTO:	TERRA-CORTRIL Pomada estéril ótico-oftálmica		
CODIGO:	13282/11	ANULA AL	13282/10
PAPEL:	offset blanco	GRAMAJE:	50 gr
LAETUS N.º	NO	ESCALA	100%
PANTONES:	294	DIMENSIONES:	105x115 mm
PLANO N.º:		PLEGADO:	105x20 mm
TIPOGRAFIA:	Helvetica Condensed (normal, cursiva, bold) Tamaño 7 puntos - Interlínea 7,5 puntos.		

Reverso:

Conforme Laboratorio:

CONTRAINdicaciones
La pomada estéril de TERRA-CORTRIL no debe utilizarse en el caso de perforación del timpano. Tampoco se utilizará en caso de hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

INCOMPATIBILIDADES

No se han descrito.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Pueden producirse reacciones alérgicas a la oxitetraciclina, así como el crecimiento de gérmenes u hongos resistentes a la misma, en cuyo caso se suspenderá la medicación.

El uso continuado de la pomada estéril de TERRA-CORTRIL OTICO-OFTALMICA, en las afecciones oculares y en tratamientos prolongados puede producir glaucoma, por lo que, en estas circunstancias, debe ser determinada periódicamente la tensión intraocular.

INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO

No se han descrito cuadros tóxicos.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

PRESENTACION

TERRA-CORTRIL POMADA ESTERIL OTICO-OFTALMICA:

Tubo de punta roma que contiene: 3,5 g de pomada.

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

**MANTENER PREFERENTEMENTE ENTRE 15 Y 30 °C
CON RECETA MEDICA**

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA
DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS**

FARMASIERRA LABORATORIOS, S.L.
Carretera de Irún, km 26,200
San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Bajo licencia de PFIZER

13282/11-Z



PRUEBA N.º 1

Fecha: 03/05/04