

MIDACINA®

USO CUTANEO

En nuestra especialidad se han reunido en asociación tres drogas de tal forma que, bajo una forma farmacéutica de aplicación tópica, aunamos las acciones terapéuticas de dos sustancias antibióticas y de un energético antiinflamatorio.

La especial estructura química del Acetónido de Fluocinolona y particularmente la presencia de dos átomos de flúor en las posiciones 6 y 9, hacen de esta droga el corticosteroide de más elevada actividad antiinflamatoria para uso tópico.

Ahora bien, en los casos de dermatosis infectadas o que pudieran infectarse durante el transcurso del tratamiento, es muy conveniente la asociación al mismo de ciertos antibióticos que, tales como la Neomicina y la Gramicidina, presentan una probada eficacia en las afecciones cutáneas.

La Gramicidina y la Neomicina son dos antibióticos de espectro reducido, pero que en asociación presentan importantes ventajas ya que no solamente se complementan ampliando la extensión de sus respectivos espectros antibacterianos, sino que presentan sinergismo entre ellos.

El espectro antibacteriano de la Gramicidina comprende casi exclusivamente a bacterias Gram positivas, tales como el *Streptococcus pyogenes* y demás estreptococos *Diplococcus pneumoniae*, algunas cepas del *Staphylococcus aureus* y el *Corynebacterium diphtheriae*. Este espectro se ve altamente ampliado al asociarlo a la Neomicina, antibiótico cuya acción abarca tanto a gérmenes Gram positivos como a Gram negativos. En efecto, podemos citar como bacterias sensibles a la Neomicina el bacilo diftérico, los estafilococos, así como también el *E. coli*, el *A. aerogenes*, los géneros *Proteus* y *Sigella*.

INDICACIONES.— Especialmente indicada en dermatitis de origen inflamatorio o alérgico, eritema solar, quemaduras leves, picaduras de insectos, prurito, eczemas, psoriasis e intertrigo.

DOSIFICACION.— Dos o tres aplicaciones diarias, de carácter local, sobre la parte afectada.

CONTRAINDICACIONES.— No deberá ser administrada a pacientes con tuberculosis cutánea y queratitis herpética.

INCOMPATIBILIDADES.— No presenta.

ADVERTENCIAS.— Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de Control del dopaje como positivo.

SOBREDOSIS.— En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: (91) 562 04 20.

PRESENTACION.— Tubo conteniendo 15 grs.

Composición: Por 1 gr.

Neomicina base	5 mg.
Gramicidina	0,5 mg.
Acetonido de fluocinolona	2 mgrs.
Excipiente (c.s.p. 1 gramo): Alcohol Cetílico, Emulgente no iónico polioxietilenado, Propilenglicol, Glicerina, Metilparaben y Agua destilada.	

Mantener el producto fuera del alcance y
de la vista de los niños

BRAUN BIEFFE TRI FOLS



Laboratorio Especialidades Nacionales, S.A.
C/ Potosí, 2 - 4.ª Planta - 08030 BARCELONA
Dir. Téc. Farm.: J. CODERCH