

# DERMO-HUBBER



## POMADA

DERMO HUBBER es una pomada para uso dermatológico cuya composición está integrada por Sulfato de Neomicina y Acetato de Hidrocortisona.

Las numerosas publicaciones (Suizberger, Robinson, Sidi y Burgeois, etc.) relativas al empleo de sustancias esteroideas en terapéutica dermatológica, ponen de relieve la superioridad de la Hidrocortisona o Compuesto F sobre la Cortisona cuando se aplica localmente en eczemas, pruritos y toda suerte de lesiones cutáneas por sensibilización.

El uso de la pomada de Hidrocortisona quedaba limitado muchas veces por la aparición de infecciones secundarias de las lesiones, ocasionadas probablemente por la inhibición de los fenómenos defensivos locales por este esteroide. Por esta razón, hemos asociado en DERM-HUBBER, antibióticos del tipo de la Neomicina y Bacitracina, cuya eficacia sobre bacterias y cocos gram positivos y gram negativos, así como la ausencia absoluta de reacciones de sensibilización, ha sido ampliamente demostrada por Meleney, Johnson, R. Church, Livingood, etc.

### COMPOSICIÓN CUANTITATIVA

Fórmula por gramo:

Neomicina (D.C.I.) (sulfato) .....	3,5 mg
Bacitracina (D.C.I.) .....	600 U.I.
Hidrocortisona (D.C.I.) acetato .....	10 mg
Vaselina filante .....	c.s.

### INDICACIONES

Dermatitis atópicas o por contacto agudo. - Dermatitis de contacto crónica. - Eczemas diatésicos o prurigo de Besnier. - Eczemas infantiles. - Eczemas bacterianos. - Intértrigo. - Neurodermatitis. - Eczema numular. - Prurito anogenital. - Prurito vulvar. - Quemaduras de segundo grado. - Radiodermatitis aguda y crónica. - Grietas de pezón.



## **POSOLOGÍA**

Vía tópica. Extiéndase una ligera capa de pomada sobre las lesiones una o dos veces al día, siempre según criterio facultativo.

## **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES**

Pacientes con historial alérgico a los componentes de la fórmula. No debe aplicarse en las pústulas vacunales ni en procesos infecciosos por virus, hongos y levaduras.

La especialidad no está concebida para uso oftálmico.

## **ADVERTENCIA**

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de control dopaje como positivo.

## **INCOMPATIBILIDADES**

Se evitará la limpieza previa con soluciones de fenol y ácido tánico.

## **EFFECTOS SECUNDARIOS**

En tratamientos muy prolongados puede producirse sensibilización, y debe atenderse a la posible acción sistémica del corticoide.

## **INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO**

El historial clínico no ha demostrado casos de intoxicación.

## **PRESENTACIÓN**

Tubo con 5 gramos.

## **CON RECETA MÉDICA.**

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS.**



**TEOFARMA srl**

Via F.lli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (PV) - Italia  
Tel. 0039/0382/422008 - Fax 0039/0382/525845  
e-mail: [servizioclienti@teofarma.it](mailto:servizioclienti@teofarma.it)

Cod. 01FODEP01

