

Ciclochem polvo
Ciclopirox olamina

COMPOSICIÓN

Por g. de polvo:

Ciclopirox olamina (D.O.E.) 10 mg.

Excipientes: Dióxido de silicio de elevada dispersión, Almidón de maíz modificado fosfatado c.s.

PROPIEDADES

Ciclochem (ciclopirox olamina) es un antifúngico sintético dotado de un apreciable poder de penetración en la dermis, y que ha demostrado ser activo frente a "*Tricophyton rubrum*", "*T. mentagrophytes*", "*Epidermophyton floccosum*", "*Microsporum canis*", "*Candida albicans*" y "*Malassezia furfur*".

INDICACIONES

Tratamiento tópico de las micosis superficiales de la piel y mucosas, tales como: Dermatitis, tinea pedis (pie de atleta), tinea cruris (eczema marginado de Hebra), y tinea corporis (herpes circinado). Candidiasis (moniliasis). Pitiriasis versicolor y Eritrasma.

POSOLOGÍA

Ciclochem se aplicará sobre las superficies afectadas y su alrededor dos veces al día, mañana y noche.

La duración requerida de tratamiento es variable, dependiendo del agente etiológico y de la localización de la lesión. En general, los síntomas desaparecen tras la 1ª semana de tratamiento pero es conveniente continuar la terapéutica una o dos semanas más a fin de evitar las recidivas.

Los pacientes con Pitiriasis versicolor suelen presentar a las dos semanas de tratamiento una curación clínica, con eliminación del agente etiológico.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Efectuada la aplicación de Ciclochem se recomienda realizar un ligero masaje sobre la lesión.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al ciclopirox olamina, o a cualquiera de los componentes de la fórmula.

PRECAUCIONES

No aplicar en los ojos.

Dado el elevado poder de penetración de ciclopirox olamina se recomienda evitar la administración intensiva y prolongada durante el **primer trimestre del embarazo y la lactancia**.

INTERACCIONES

No se han descrito.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Pueden aparecer en pacientes hipersensibles síntomas de irritación local, sensación de quemazón y picor, normalmente moderados y transitorios, que no suelen determinar la suspensión del tratamiento y que son más frecuentes durante los primeros días de su aplicación.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

Si se desarrollase alguna reacción de hipersensibilidad durante su utilización, deberá suspenderse el tratamiento, e instaurar la terapia apropiada.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

PRESENTACIÓN

Ciclochem polvo

Envases conteniendo 30 g de polvo.

OTRAS PRESENTACIONES

Ciclochem solución

Envases conteniendo 30 ml de solución.

Ciclochem crema vaginal

Envases conteniendo 40 g de crema vaginal.

Ciclochem crema

Envases conteniendo 30 y 60 g de crema.

Ciclochem uñas

Envases conteniendo 3 g de solución.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.

LABORATORIOS NOVAG, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94.

08028-BARCELONA

Dir. Técnico: R. Caneña