

ENANGEL[®], KETESGEL[®], QUIRGEL[®]
(gel de dexketoprofeno)

INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL PACIENTE
SOBRE REACCIONES FOTOALÉRGICAS

Su médico le ha prescrito este medicamento. A continuación le recordamos algunos aspectos sobre las precauciones que deben tomarse respecto a las posibles reacciones de fotoalergia mientras lo esté utilizando:

La exposición al sol (incluso en días nublados) o a la luz de los aparatos de rayos UV en zonas tratadas con fórmulas tópicas de dexketoprofeno puede originar reacciones en la piel potencialmente graves (debidas a la fotosensibilización, es decir una reacción alérgica por el efecto de la luz solar), aunque su aparición es poco frecuente. Éstas pueden incluir reacciones severas de eccemas que pueden extenderse o generalizarse. También pueden producirse otras reacciones alérgicas en la piel. El componente activo de Enangel, Kestegel y Quirgel es dexketoprofeno, un antiinflamatorio.

Así pues, deben respetarse las siguientes recomendaciones antes, durante el uso y hasta 2 semanas después de la interrupción del tratamiento con Enangel, Kestegel y Quirgel :

- **No utilice Enangel, Kestegel o Quirgel si tiene o ha tenido alguna alergia a dexketoprofeno en forma tópica (principio activo de Enangel, Kestegel y Quirgel) o a otros componentes tales como el ácido tiaprofénico, el fenofibrato, los protectores UV (protectores solares, concretamente los que contienen octocrileno) o perfumes.**
- **No exponga las zonas tratadas con Enangel, Kestegel o Quirgel a la luz del sol (incluso en los días nublados) o a la luz de los aparatos de rayos UV y, cuando esté en el exterior, proteja con ropa estas zonas. Debe ser así durante el tratamiento y hasta 2 semanas después de su interrupción.**
- No utilice Enangel, Kestegel o Quirgel bajo vendajes oclusivos.
- **Lávese bien las manos tras cada aplicación de Enangel, Kestegel o Quirgel.**
- Limite la duración del tratamiento con Enangel, Kestegel o Quirgel a una semana.
- **Deje de utilizar Enangel, Kestegel o Quirgel inmediatamente si sufre cualquier reacción en la piel,** incluso reacciones tras la coaplicación de productos que contengan octocrileno. El octocrileno es un excipiente utilizado en diversos productos cosméticos y de higiene (por ejemplo, protectores solares, champús, masajes para después del afeitado, geles de baño y ducha, cremas para la piel, lápiz de labios, cremas antiedad, desmaquilladores y sprays para el cabello) a fin de retrasar la fotodegradación.

Si precisa más información, consulte con su médico o con su farmacéutico y el prospecto del medicamento.

RECUERDE:

- **No utilice Enangel, Kestegel o Quirgel si tiene o ha tenido anteriormente alguna alergia con estos medicamentos**
- **Durante el tratamiento con estos medicamentos y hasta dos semanas después de finalizarlo:**
 - **no exponga las zonas tratadas con Enangel, Kestegel o Quirgel a la luz del sol (incluso en los días nublados) o a la luz de los aparatos de rayos UV**
 - **cuando esté en el exterior, proteja con ropa estas zonas**
- **Lávese bien las manos tras cada aplicación de Enangel, Kestegel o Quirgel.**
- **Deje de utilizar Enangel, Kestegel o Quirgel inmediatamente si sufre cualquier reacción en la piel.**