

Spasmoctyl Pediátrico

Otilonio bromuro

Grageas - Vía oral



COMPOSICIÓN

Cada gragea contiene:

Otilonio bromuro (DCI) 10 mg

Excipientes: Almidón de maíz, celulosa microcristalina, palmitoestearato de glicerol, colorante azul A-2 (E-132), laca aluminica de azul A-2, dióxido de titanio (E-171), hipromelosa, macrogol 400 y agua purificada, c.s.

PROPIEDADES

SPASMOCTYL PEDIATRICO posee una actividad espasmolítica selectiva sobre la musculatura lisa del canal digestivo sin presentar efectos colaterales de tipo atropínico, ni influir sobre la tensión arterial.

INDICACIONES

Estados espásticos y discinesias funcionales del aparato gastroentérico (colon irritable, gastritis y gastroduodenitis, enteritis, afecciones esofágicas).

Vómito habitual del niño: piloroespasmo, enteropatía diarreica, estreñimiento espasmódico.

CONTRAINDICACIONES

No debe administrarse en la obstrucción intestinal.

INCOMPATIBILIDADES Y EFECTOS SECUNDARIOS

No se han descrito.

PRECAUCIONES

Se aconseja administrar este producto con precaución en los casos de glaucoma.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

En caso de administración accidental excesiva del producto, debe provocarse la evacuación del fármaco y proceder a un lavado gástrico. Puede requerirse tratamiento médico.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

POSOLOGÍA

De media a 3 grageas al día (5-30 mg), según edad y a juicio del médico.

PRESENTACIÓN

Envase con 60 grageas.

Con receta médica

**Los medicamentos deben mantenerse
fuera del alcance de los niños**

