

## Prospecto

### TANAKENE

### Solución oral

Extracto de Ginkgo biloba (EGb 761)

#### COMPOSICIÓN

Extracto de Ginkgo biloba (EGb 761) .....	4 g
Etanol (96 por ciento).....	59,0 ml
Otros excipientes, c.s.p.....	100 ml

Los otros excipientes son: esencia de naranja soluble, esencia de limón soluble, sacarina sódica y agua purificada

1 ml de solución contiene 40 mg de extracto de Ginkgo biloba (EGb 761).

#### INDICACIONES

Insuficiencia circulatoria cerebral y sus manifestaciones funcionales (vértigos, cefaleas, pérdidas de memoria, descenso de las facultades intelectuales, trastornos de la motilidad, perturbaciones afectivas y del carácter).

Secuelas de accidentes vasculares cerebrales y de los traumatismos craneoencefálicos.

Trastornos vasculares periféricos: arteriopatías de los miembros inferiores y sus complicaciones tróficas, trastornos vasomotores distales y afectación de la microcirculación (enfermedad de Raynaud, acroparestesia, acroeritrocianosis, fragilidad capilar).

Trastornos neurosensoriales de causa vascular en ORL y Oftalmología.

#### TITULAR Y FABRICANTE

##### *Titular*

FAES FARMA, S.A.  
Máximo Aguirre, 14  
48940 Leioa

##### *Fabricante*

##### **BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE**

20, Rue Ethe Virton  
28100 Dreux - Francia

#### DOSIFICACIÓN

A criterio médico. Como promedio, de 3 a 4 ml diarios repartidos en dos tomas, antes de la comida y antes de la cena.

#### NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO

Utilizar la medida que se acompaña al frasco para dosificar con exactitud. Verter la cantidad de solución prescrita en un vaso con un poco de agua, y agitar si es necesario.

#### PRESENTACIÓN

Frasco de 50 ml.

#### CONTRAINDICACIONES

No se han observado.

## **EFFECTOS SECUNDARIOS**

No se han observado, para las indicaciones y modo de administración recomendados.

## **PRECAUCIONES**

Este medicamento contiene 57% de etanol en volumen final. Cada ml contiene 0,45 g de etanol, lo que puede ser causa de riesgo en niños, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, daños o lesiones cerebrales. Puede modificar o potenciar el efecto de otros medicamentos.

## **INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO**

En caso de sobredosis, los efectos adversos dependen principalmente de la cantidad de alcohol ingerida.


Aparte de tales efectos, en caso de ingestión del contenido de un frasco o más cabe esperar los siguientes síntomas: náuseas, vómitos, gastralgias, diarrea, cefalea, sensación de vértigo, hipotensión, poliuria.

Terapéutica que se recomienda: actitud conservadora, bebidas (té, café ligero); ocasionalmente, tópico digestivo, y si hay cefalea, antiálgico clásico.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de información Toxicológica. Teléfono 91.562.04.20

## **CONDICIONES PARA SU CONSERVACIÓN**

Consérvese en lugar fresco y seco, protegido de la luz.



### **ADVERTENCIA**

El principio activo de la especialidad TANAKENE, extraído de las hojas de Ginkgo biloba, como otros extractos vegetales, puede presentar ligeras variaciones de color, sin que por ello varíe en absoluto su actividad.

### **MODO DE EMPLEO**

Utilizar el dosificador en forma de jeringa\* que acompaña el frasco.

#### **Para llenar la jeringa**

Después de haber presionado el émbolo hasta el fondo, introducir la jeringa en el frasco y aspirar el medicamento hasta señalar la dosis prescrita.

#### **MANTENGA TANAKENE FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS**

\*CE 0459

FAES FARMA, S.A.  
Máximo Aguirre, 14  
48940 Leioa

Texto revisado: Marzo 2008 versión: Marzo 2013