



Instrucciones de uso de Aimovig plumas precargadas

Esquema de la pluma de Aimovig 70 mg (con cuerpo de color azul claro, botón de inicio violeta, capuchón blanco y protector de seguridad verde)



Nota: La aguja está en el interior de la pluma.

Esquema de la pluma de Aimovig 140 mg (con cuerpo de color azul oscuro, botón de inicio gris, capuchón naranja y protector de seguridad amarillo)



Nota: La aguja está en el interior de la pluma.

General

Antes de usar la pluma precargada de Aimovig, lea esta información importante.



Paso 1: Preparación

Nota: La dosis de Aimovig que le han recetado es o bien 70 mg o 140 mg. Esto significa que para la dosis de 70 mg se tiene que inyectar el contenido de una pluma para un solo uso de 70 mg. Para la dosis de 140 mg se tiene que inyectar el contenido de una pluma para un solo uso de 140 mg o de dos plumas para un solo uso de 70 mg de forma consecutiva.

(A)

Saque cuidadosamente la(s) pluma(s) precargada(s) de Aimovig de la caja. Según la dosis que le hayan recetado, puede que necesite usar o una o dos plumas. No agitar.

Para evitar cualquier molestia en el lugar de inyección, mantenga la(s) pluma(s) a temperatura ambiente durante al menos 30 minutos antes de la inyección.

Nota: No intente calentar la(s) pluma(s) usando una fuente de calor como agua caliente o microondas.

(B)

Examine visualmente la(s) pluma(s). Asegúrese que la solución que ve a través de la ventana es transparente e incolora o amarillo claro.

Nota:

- No utilice la(s) pluma(s) si algún componente se ve agrietado o roto.
- No utilice cualquier pluma que se haya caído.
- No utilice la pluma si falta el capuchón o no está firmemente unido.

En todos los casos descritos anteriormente utilice una pluma nueva y si tiene alguna duda póngase en contacto con su médico o farmacéutico.


(C)

Reúna todo el material necesario para la(s) inyección(es).

Lávese las manos a fondo con agua y jabón.


Sobre una superficie de trabajo limpia y bien iluminada coloque:

- Pluma(s) nueva(s)
- Toallita(s) humedecida(s) en alcohol
- Torunda(s) de algodón o gasa(s)
- Apósito(s) adhesivo(s) (tiritas)
- Contenedor de eliminación de objetos punzantes



(D)

Prepare y limpie el(los) lugar(es) de inyección.



Puede utilizar cualquiera de los siguientes lugares de inyección:

- Muslo
- Zona del vientre (abdomen) (excepto un área de 5 centímetros alrededor del ombligo)
- Zona externa de la parte superior del brazo (solo si otra persona va a administrarle la inyección)

Limpie la zona de inyección con una toallita humedecida con alcohol y deje secar la piel.

Elija un lugar diferente cada vez que se ponga una inyección. Si necesita utilizar la misma zona de inyección, asegúrese que no es el mismo punto que utilizó la última vez.


Nota:

- Tras haber limpiado la zona, no vuelva a tocarla antes de la inyección.
- No elija una zona donde la piel sea sensible, esté dañada, enrojecida o endurecida. Evite la inyección en zonas con cicatrices o estrías.

Paso 2: Prepárese

(E)

En cuanto esté preparado para la inyección (no antes), retire el capuchón tirando de él hacia fuera en línea recta. Desde ese momento, la inyección se debe administrar en el plazo máximo de 5 minutos. Es normal ver en la punta de la aguja o protector de seguridad una gota de líquido.



Nota:


- No deje el capuchón fuera durante más de 5 minutos, ya que el medicamento podría secarse.
- No gire ni doble el capuchón.
- No volver a colocar en la pluma el capuchón tras haberlo quitado.

(F)

Estire o pellizque la piel del lugar de inyección para obtener una superficie firme.


Método del estiramiento

Estire firmemente la piel desplazando el pulgar y los otros dedos en sentidos opuestos para delimitar un área de unos **cinco** centímetros de ancho.



Método del pellizco

Pellizque firmemente la piel entre el pulgar y los demás dedos para delimitar un área de unos **cinco** centímetros de ancho.




Nota: Mantenga la piel estirada o pellizcada mientras inyecta.

Paso 3: Inyección

(G)


Mantenga la piel estirada/pellizcada. Habiendo retirado el capuchón, coloque la pluma sobre la piel formando un ángulo de 90 grados




Nota: Todavía no toque el botón de inicio.

(H)

Presione firmemente la pluma sobre la piel hasta que ya no avance más.



Presione



Nota: Debe presionar al máximo pero no toque el botón de inicio hasta que esté listo para inyectar.


(I)

Pulse el botón de inicio. Oirá un “clic”.




(J)


Levante el pulgar del botón, pero mantenga presionada la pluma sobre la piel. La inyección puede durar unos 15 segundos.



15 segundos



Nota: Cuando la inyección haya finalizado, la ventana se pondrá amarilla y podrá oír un segundo “clic”.



Nota:

- Cuando levante la pluma de la piel, la aguja quedará cubierta automáticamente por el protector de seguridad.
- Si al retirar la pluma, la ventana no se ha puesto amarilla o si parece que todavía se está inyectando medicamento, eso significa que no ha recibido una dosis completa. Póngase en contacto con su médico inmediatamente.

Paso 4: Final

(K)

Deseche la pluma usada y el capuchón.

Deposite la pluma usada en un contenedor de eliminación de objetos punzantes inmediatamente después de su uso. Consulte a su médico o farmacéutico sobre la forma de eliminación correcta. Es posible que exista una normativa local al respecto.

Nota:

- No reutilice la pluma.
- No recicle la pluma ni el contenedor de eliminación de objetos punzantes, ni los tire junto con los residuos domésticos.
- Mantenga siempre el contenedor de eliminación de objetos punzantes fuera del alcance de los niños.



(L)

Examine el lugar de inyección.

Si hay algo de sangre en la piel, presione una torunda de algodón o una gasa sobre el lugar de inyección. No frote el lugar de inyección. Si es necesario póngase una tirita.

Si le han recetado una dosis de 140 mg y está usando dos plumas de Aimovig 70 mg, repita los pasos desde 1(D) hasta 4 con la segunda pluma para inyectar la dosis completa.

