


## Kevzara 150 mg solución inyectable en jeringa precargada sarilumab

### Instrucciones de uso

Las partes de la jeringa precargada de Kevzara se muestran en este dibujo.



### Información importante

Este dispositivo es una jeringa precargada de una sola dosis (denominada “jeringa” en estas instrucciones). Contiene 150 mg de Kevzara para inyección por debajo de la piel (inyección subcutánea) una vez cada dos semanas.

Solicite a su profesional sanitario que le muestre cómo usar de forma correcta la jeringa antes de su primera inyección.

### Qué debe hacer

- ✓ Lea todas las instrucciones detenidamente antes de utilizar una jeringa.
- ✓ Compruebe que tiene el medicamento correcto y la dosis correcta.
- ✓ Guarde las jeringas sin usar en el envase original y consérvelas en la nevera a una temperatura entre 2°C y 8°C.
- ✓ Guarde el envase en una bolsa isotérmica con un acumulador de frío cuando viaje.
- ✓ Deje que la jeringa alcance la temperatura ambiente durante al menos 30 minutos antes de usarla.
- ✓ Use la jeringa en un plazo de 14 días después de sacarla de la nevera o de la bolsa isotérmica.

- ✓ Mantenga la jeringa fuera de la vista y del alcance de los niños.

### Qué no debe hacer

- ✗ No use la jeringa si ésta ha sufrido daños o si falta el capuchón de la aguja o no está sujeto.
- ✗ No quite el capuchón de la aguja hasta que no esté preparado para la inyección.
- ✗ No toque la aguja.
- ✗ No trate de volver a ponerle el capuchón a la jeringa.
- ✗ No reutilice la jeringa.
- ✗ No congele ni caliente la jeringa.
- ✗ Una vez se saca de la nevera, no conserve la jeringa a temperatura superior a 25°C.
- ✗ No exponga la jeringa a la luz solar directa.
- ✗ No inyecte a través de la ropa.

**Si tiene cualquier pregunta adicional, consulte con su médico, farmacéutico o enfermero o llame al número de sanofi indicado en el prospecto.**


### Paso A: Preparación para la inyección

#### 1. Prepare todo el equipo que va a necesitar en una zona limpia y plana.

- Necesitará una toallita con alcohol, una bola de algodón o gasa, y un contenedor para objetos punzantes.
- Saque una jeringa del envase cogiéndola por el medio del cuerpo de la jeringa. Guarde la jeringa restante en el envase en la nevera.


#### 2. Mire la etiqueta.

- Compruebe que tiene el medicamento y la dosis correctos.
- Compruebe la fecha de caducidad (CAD).
- ✗ No use la jeringa si está caducada.




#### 3. Mire el medicamento.

- Compruebe que el líquido es transparente e incoloro a color amarillo pálido.
- Puede ver una burbuja de aire, esto es normal.
- ✗ No proceda con la inyección si el líquido está turbio, decolorado o contiene partículas.




**4. Coloque la jeringa sobre una zona plana y deje que alcance la temperatura ambiente (<math><25^{\circ}\text{C}</math>) durante al menos 30 minutos.**

- Usar la jeringa a temperatura ambiente puede hacer la inyección más cómoda.
- ✗ **No** use la jeringa si ésta ha estado fuera de la nevera más de 14 días.
- ✗ **No** caliente la jeringa; deje que se atempere de forma natural.
- ✗ **No** exponga la jeringa a la luz solar directa.



**5. Seleccione el lugar de la inyección.**

- Puede inyectar en su muslo o vientre (abdomen) excepto en los 5 cm alrededor de su ombligo. Si alguien le pone la inyección, también puede elegir la parte exterior y superior del brazo.
- Cambie el lugar de la inyección cada vez que se inyecte.
- ✗ **No** realice la inyección en la piel sensible, dañada ni con hematomas o cicatrices.



● Lugares de inyección


## 6. Prepare el lugar de la inyección.

- Lávese las manos.
- Desinfecte la piel con una toallita con alcohol.
- ✗ No vuelva a tocar el lugar de la inyección antes de la inyección.

## Paso B: Realice la inyección – Proceda con el Paso B solo tras completar el Paso A “Preparación para la inyección”


### 1. Retire el capuchón de la aguja.

- Sujete la jeringa por el medio del cuerpo de la jeringa apuntando en dirección contraria a usted.
- Mantenga su mano fuera del émbolo.
- ✗ No elimine las burbujas de aire en la jeringa.
- ✗ No retire el capuchón hasta que esté preparado para realizar la inyección.
- ✗ No vuelva a poner el capuchón en la aguja.




### 2. Pellizque la piel.

- Use el pulgar y el dedo índice para pellizcar un pliegue de piel en el lugar de la inyección.




3. Introduzca la aguja en el pliegue de piel en un ángulo de aproximadamente 45°.




4. Empuje el émbolo hacia abajo.

- Empuje el émbolo lentamente hasta que se detenga y la jeringa esté vacía.



5. Antes de retirar la aguja, compruebe que la jeringa esté vacía.

- Retire la aguja con el mismo ángulo con el que se realizó la inyección.
- Si ve algo de sangre, presione en el lugar de la inyección con una bola de algodón o una gasa.
- ✗ No se frote la piel después de ponerse la inyección.



**6. Ponga la jeringa usada y el capuchón en un contenedor para objetos punzantes de forma inmediata tras su uso.**

- Mantenga siempre el contenedor fuera de la vista y del alcance de los niños.
- ✗ **No** vuelva a poner el capuchón en la aguja.
- ✗ **No** tire la jeringa usada a la basura.
- ✗ **No** recicle el contenedor para objetos punzantes usado.
- ✗ **No** tire el contenedor para objetos punzantes usado a la basura a no ser que la normativa local lo permita. Pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero cómo deshacerse del contenedor.

