



TERRACORTIL

Oxitetraciclina, Hidrocortisona, Polimixina

POMADA ESTERIL OTICO-OFTALMICA

(Vía ótico-oftálmico)

COMPOSICION

Cada gramo de pomada contiene:

Oxitetraciclina (D.O.E.) (hidrocloruro)..... 5 mg

Hidrocortisona (D.O.E.) acetato 10 mg

Polimixina B (D.O.E.) (sulfato) 10.000 U.

Excipientes: Vaselina líquida; Vaselina filante. c.s.

TITULAR

Farmasierra Laboratorios S.L. Carretera de Irún, km 26,200 -28700 San Sebastian de los Reyes (Madrid)

RESPONSABLE DE LA FABRICACION

Farmasierra Manufacturing S.L. Carretera de Irún, km 26,200 -28700 San Sebastian de los Reyes (Madrid)

INDICACIONES

Afecciones oculares: Blefaritis aguda y crónica, conjuntivitis no específica, alérgica o flictenular, tanto aguda como crónica, úlcera corneal infectada, queratitis, herpes zoster infectado, iritis, escleritis, etc.

Afecciones óticas: Otitis externa (difusa, alérgica, atópica), impétigo, forunculosis, eczema y otras infecciones localizadas en el oído externo.

DOSIFICACION Y ADMINISTRACION

En las afecciones oculares se aplica directamente del tubo en el saco conjuntival del ojo afectado, más o menos 1,5 cm de la pomada 2 ó 3 veces al día.

En las afecciones óticas se coloca, aproximadamente, 1,5 cm de la pomada sobre un aplicador con algodón o se aplica en el área afectada del oído externo, 3 a 4 veces al día.

CONTRAINDICACIONES

La pomada estéril de TERRA-CORTIL no debe utilizarse en el caso de perforación del tímpano. Tampoco se utilizará en caso de hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

INCOMPATIBILIDADES

No se han descrito.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Pueden producirse reacciones alérgicas a la oxitetraciclina, así como el crecimiento de gérmenes u hongos resistentes a la misma, en cuyo caso se suspenderá la medicación.

El uso continuado de la pomada estéril de TERRA-CORTIL OTICO-OFTALMICA, en las afecciones oculares y en tratamientos prolongados puede producir glaucoma, por lo que, en estas circunstancias, debe ser determinada periódicamente la tensión intraocular.

INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO

No se han descrito cuadros tóxicos.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

PRESENTACION

TERRA-CORTIL POMADA ESTERIL OTICO-OFTALMICA:

Tubo de punta roma que contiene: 3,5 g de pomada.

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

MANTENER PREFERENTEMENTE ENTRE 15 Y 30 °C

CON RECETA MEDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Bajo licencia de PFIZER

FARMASIERRA LABORATORIOS, S.L.

Carretera de Irún, km 26,200

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (Madrid)