

## Prospecto: información para el usuario

### Zovirax 200 mg comprimidos dispersables

aciclovir

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

#### Contenido del prospecto

1. Qué es Zovirax y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Zovirax
3. Cómo tomar Zovirax
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Zovirax
6. Contenido del envase e información adicional

#### 1. Qué es Zovirax y para qué se utiliza

Zovirax contiene el principio activo aciclovir. Este pertenece a un grupo de medicamentos llamados antivíricos. Actúa deteniendo el crecimiento de ciertos virus.

Zovirax se puede utilizar para:

- tratar infecciones de la piel y las membranas mucosas causadas por el virus del herpes simple (herpes labial, herpes genital y otras infecciones por herpes simple)
- prevenir recurrencias de infecciones recurrentes por herpes simple (evitar que estos problemas reaparezcan después de haberlos tenido)
- prevenir las infecciones por herpes simple en pacientes inmunocomprometidos (evitar estos problemas en personas cuyo sistema inmune funciona peor, lo que significa que sus cuerpos son menos capaces de combatir infecciones)
- tratar la varicela y el herpes zóster (culebrilla)

#### 2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Zovirax

##### No tome Zovirax:

- si es alérgico al aciclovir, valaciclovir o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

##### Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Zovirax:

- Si padece alguna enfermedad del riñón o tiene usted edad avanzada. Es posible que su médico necesite bajarle la dosis. Asimismo, debe beber suficiente cantidad de líquido durante el tratamiento para mantener una hidratación adecuada.
- Si padece infección por herpes genital, se recomienda tomar precauciones durante las relaciones sexuales aunque se haya iniciado el tratamiento antiviral.

### **Toma de Zovirax con otros medicamentos**

Comuníquese a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Comuníquese a su médico si ha tomado recientemente probenecid, cimetidina o micofenolato de mofetilo (medicamento utilizado en pacientes trasplantados).

### **Embarazo y lactancia**

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Aciclovir pasa a la leche materna. Contacte con su médico o farmacéutico si usted está en periodo de lactancia.

### **Conducción y uso de máquinas**

Algunos efectos adversos como somnolencia o sueño puede afectar a su capacidad para concentrarse y reaccionar. No conduzca o maneje maquinaria si siente que su capacidad está afectada.

### **Zovirax 200 mg comprimidos dispersables contiene sodio**

Este medicamento contiene menos de 23 mg de sodio (1 mmol) por comprimido; esto es, esencialmente “exento de sodio”.

## **3. Cómo tomar Zovirax**

Su médico decidirá la dosis correcta, la frecuencia y la duración del tratamiento, dependiendo de:

- la edad
- el tipo de infección que tenga
- si es para tratar la infección o para evitar que reaparezca

**Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico.** En caso de duda, consulte de nuevo con su médico o farmacéutico.

### **Tratamiento de infecciones producidas por herpes simple (tratamiento de herpes labial, herpes genital y otras infecciones por herpes simple):**

#### **Uso en adultos**

La dosis recomendada es 200 mg cinco veces al día, durante la parte del día en que se encuentra despierto (omitiendo la administración mientras duerme por la noche), aproximadamente cada cuatro horas durante cinco días.

Su médico puede ajustar la dosis según sea necesario (por ejemplo, en caso de que tenga una resistencia inmune reducida; sea una persona mayor o tenga problemas renales). Si es una persona mayor o tiene problemas renales, es importante beber mucha agua durante el tratamiento.

#### **Uso en niños**

Niños menores de 2 años: 100 mg, cinco veces al día, cada cuatro horas durante la parte del día en que se encuentra despierto (omitiendo la administración mientras duerme por la noche).

Niños mayores de 2 años: 200 mg, cinco veces al día, cada cuatro horas durante la parte del día en que se encuentra despierto (omitiendo la administración mientras duerme por la noche).

Otras presentaciones de este medicamento pueden ser más adecuadas para niños. **Consulte a su médico o farmacéutico.**

**Prevenir la recurrencia de infecciones recurrentes por herpes simple (evitar que estos problemas reaparezcan después de haberlos tenido):**

**Uso en adultos**

La dosis recomendada es un comprimido de 200 mg, cuatro veces al día, cada seis horas.

Debe de tomar Zovirax hasta que su médico le indique que interrumpa el tratamiento.

Su médico puede ajustar la dosis según sea necesario (por ejemplo, en caso de que tenga una resistencia inmune reducida; sea una persona mayor o tenga problemas renales). Si es una persona mayor o tiene problemas renales, es importante beber mucha agua durante el tratamiento.

**Prevenir infecciones por herpes simple en pacientes inmunocomprometidos (evitar estos problemas en personas cuyo sistema inmune funciona peor, lo que significa que sus cuerpos son menos capaces de combatir infecciones):**

**Uso en adultos**

La dosis recomendada es de 200 mg, cuatro veces al día, cada seis horas.

Debe de tomar Zovirax hasta que su médico le indique que interrumpa el tratamiento.

Su médico puede ajustar la dosis según sea necesario (por ejemplo, en caso de que tenga una resistencia inmune reducida; sea una persona mayor o tenga problemas renales). Si es una persona mayor o tiene problemas renales, es importante beber mucha agua durante el tratamiento.

**Uso en niños**

Niños menores de 2 años: 100 mg, cuatro veces al día, cada seis horas.

Niños mayores de 2 años: 200 mg, cuatro veces al día, cada seis horas.

Otras presentaciones de este medicamento pueden ser más adecuadas para niños. Consulte a su médico o farmacéutico.

**Tratamiento de la varicela y el herpes zóster (culebrilla):**

**Uso en adultos**

La dosis recomendada es 800 mg, cinco veces al día, durante la parte del día en que se encuentra despierto (omitiendo la administración mientras duerme por la noche), aproximadamente cada cuatro horas, durante siete días.

Su médico puede ajustar la dosis según sea necesario (por ejemplo, en caso de que tenga una resistencia inmune reducida; sea una persona mayor o tenga problemas renales). Si es una persona mayor o tiene problemas renales, es importante beber mucha agua durante el tratamiento.

**Uso en niños**

Niños menores de 2 años: 200 mg, cuatro veces al día.

Niños entre 2 y 6 años: 400 mg, cuatro veces al día.

Niños mayores de 6 años: 800 mg, cuatro veces al día.

El tratamiento debe de seguirse durante cinco días. Su médico puede ajustar la dosis dependiendo del peso corporal.

Otras presentaciones de este medicamento pueden ser más adecuadas para niños. Consulte a su médico o farmacéutico.

Disolver el comprimido en un mínimo de 50 ml de agua y agitar antes de tomar.

Si estima que la acción de Zovirax es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

#### **Si toma más Zovirax del que debe**

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

#### **Si olvidó tomar Zovirax**

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas, simplemente espere a la siguiente dosis.

### **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

#### **Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)**

- Dolor de cabeza, mareos, sensación de cansancio, fiebre.
- Náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago.
- Prurito, erupciones cutáneas (algunas veces causadas por la sensibilidad a la luz solar).

#### **Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)**

- Pérdida de cabello.
- Urticaria.

#### **Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas)**

- Alteración de los análisis de sangre (aumentos reversibles de bilirrubina y enzimas hepáticas, aumentos de la urea sanguínea y la creatinina).
- Dificultad para respirar.
- Angioedema (hinchazón de los labios, los ojos y la lengua).
- Reacción alérgica repentina y grave (reacción anafiláctica).

#### **Efectos adversos muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas)**

- Anemia (descenso del número de glóbulos rojos) o leucopenia (descenso del número de glóbulos blancos), cardenales (por descenso en el número de plaquetas).
- Agitación, confusión, temblores, dificultad de movimientos, dificultad al hablar, confusión o imaginación de cosas (alucinaciones), alteraciones en la personalidad y el comportamiento de la persona, convulsiones, somnolencia, encefalopatía (alteración en el cerebro), coma. Estos efectos son generalmente reversibles y normalmente aparecieron en pacientes con trastornos de los riñones o con factores predisponentes.
- Hepatitis (inflamación del hígado), ictericia (color amarillo de la piel y ojos), fallo renal agudo, dolor renal (puede estar asociado a fallo renal).

Avise a su médico **inmediatamente** si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas de alergia: pitos bruscos en la respiración, palpitaciones u opresión en el pecho, colapso, hinchazón de párpados, cara, labios u otra parte del cuerpo, erupción en la piel o cardenales. Estos síntomas pueden significar que usted es alérgico a Zovirax. **No tome** más comprimidos a menos que su médico se lo indique.

### **Comunicación de efectos adversos**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaRAM.es>. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

### **5. Conservación de Zovirax**

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No conservar a temperatura superior a 30°C. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la humedad.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

### **6. Contenido del envase e información adicional**

#### **Composición de Zovirax 200 mg comprimidos dispersables**

- El principio activo es aciclovir. Cada comprimido contiene 200 mg de aciclovir.
- Los demás componentes (excipientes) son: núcleo: celulosa microcristalina (E460), silicato de aluminio y magnesio, carboximetilalmidón sódico (tipo A) (de patata), povidona K30, estearato de magnesio (E572). Recubrimiento: dióxido de titanio (E171), hipromelosa, macrogol 400, macrogol 8000.

#### **Aspecto del producto y contenido del envase**

Blíster de PVC/PVDC/aluminio/papel a prueba de niños.

Envase que contiene 25 comprimidos dispersables.

#### **Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación**

#### **Titular de la autorización de comercialización**

GlaxoSmithKline, S.A.

P.T.M. C/ Severo Ochoa, 2

28760 Tres Cantos (Madrid)

Tel: +34 900 202 700

es-ci@gsk.com

**Responsable de la fabricación**

Glaxo Wellcome, S.A.  
Avda. De Extremadura, 3  
09400 Aranda de Duero (Burgos)

**Fecha de la última revisión de este prospecto:** agosto 2025

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es>