

## CLINADIL cápsulas

Es un fármaco específico y atóxico de gran eficacia en el tratamiento de los trastornos circulatorios, especialmente a nivel cerebral. Su acción la ejerce a nivel arterial y capilar de forma selectiva en las zonas isquémicas, sin inducir derivación sanguínea.

### COMPOSICION

Por cápsula:

Cinarizina (D.C.I.) ..... 20,0 mg  
Dihidroergocristina metansulfonato ..... 1,5 mg  
Excipientes: Almidón de maíz, estearato de magnesio, celulosa microcristalina.

### INDICACIONES

Síndrome vertiginoso: vértigos, mareos, acúfenos, marcha insegura.

Vértigos de origen cervicoartrósico: Síndrome de Barré-Liéou. Vértigos posturales y funcionales.

### POSOLOGIA

#### Inicial:

Dos cápsulas, dos o tres veces al día, antes o después de las comidas.

#### Mantenimiento:

Una cápsula, dos o tres veces al día, antes o después de las comidas.

### CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

No se han descrito. Puede administrarse a hipotensos y diabéticos.

### INCOMPATIBILIDADES

No se han descrito.

### INTERACCIONES

No se han descrito

### EFFECTOS SECUNDARIOS

En rarísimos casos puede presentarse una ligera somnolencia o molestias digestivas, que ceden al disminuir la dosis.

### INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO

No se han descrito efectos tóxicos con este preparado. En caso de sobredosificación accidental, se tratará de la forma habitual.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

### PRESENTACION

Envase con 45 cápsulas.

### IMPORTANTE

No dejar los medicamentos al alcance de los niños.

No conservar a temperatura superior a 25°.

### CON RECETA MÉDICA

Fabricado por Laboratorios Medicamentos Internacionales, S.A.

Laboratorio STADA, S.L.  
C/ Frederic Mompou nº 5  
08960 Sant Just Desvern, Barcelona