

TERRACORTRIL POMADA TOPICA

Oxitetraciclina, hidrocortisona

COMPOSICION

Cada gramo de pomada contiene:

Oxitetraciclina (hidrocloruro) 30 mg

[illegible]

Excipientes: Vaselina Líquida, Vaselina filante..... c.s.

TITULAR

FARMASIERRA LABORATORIOS S.L. – Ctra. de Irún, km 26,200 - 28700 San Sebastián de los Reyes - Madrid

RESPONSABLE DE FABRICACION

FARMASIERRA MANUFACTURING S.L. – Ctra. de Irún, km 26,200 - 28700 San Sebastián de los Reyes - Madrid

INDICACIONES

Infecciones piógenas superficiales (forunculosis, acné, piodermatitis, dermatitis pustular, eczemas infectados, etc.). Úlceras varicosas y traumáticas. Quemaduras y heridas infectadas. Dermatitis atópica, por contacto y otras dermatosis. Prurito inespecífico en ano, vulva y escroto. Eczema infantil.

DOSIFICACION Y ADMINISTRACION

Después de efectuar una minuciosa limpieza de la zona cutánea afectada, se aplicará suavemente una pequeña cantidad de la pomada. Las aplicaciones deben hacerse 2 a 4 veces al día. El intervalo entre las aplicaciones se aumentará progresivamente a medida que se obtenga una respuesta adecuada al tratamiento. Puede también aplicarse la pomada sobre una gasa estéril, colocando ésta sobre la zona afectada, permitiendo así que el medicamento permanezca en continuo contacto con la misma.

CONTRAINDICACIONES

CONTRAINDICACIONES
La pomada tópica de TERRA-CORTRIL está contraindicada en las lesiones tuberculosas de la piel, herpes simple, varicela y vacuna antivariólica.

INCOMPATIBILIDADES

No se han descrito.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Pueden producirse reacciones alérgicas a la oxitetraciclina, así como el crecimiento de gérmenes u hongos resistentes a la misma, en cuyo caso se suspenderá la medicación.

INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO

No se han descrito cuadros tóxicos.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

PRESENTACIONES

Tubos conteniendo 4.7 g y 14.2 g de pomada.

CADUCIDAD

CADUCIDAD
Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

MANTENER PREFERENTEMENTE ENTRE 15 Y 30 °C

CON RECETA MEDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS

Farmasierra Laboratorios s.l.
Ctra. de Irún km 26,200
San Sebastián de los Reyes.
Madrid

Baio licencia de PFIZER

CORREO ELECTRÓNICO

sugerencias_ft@aemps.es

Se atenderán exclusivamente incidencias informáticas sobre la aplicación CIMA (<https://cima.aemps.es>)

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID