



® COLIRCUSÍ CLORAMFENICOL

COMPOSICIÓN.- Cada ml contiene 5 mg de cloramfenicol.

Excipientes: tiomersal, polietilenglicol, ácido bórico, tetraborato sódico, polisorbato 20 y agua purificada.

PROPIEDADES.- El cloramfenicol es un antibiótico de amplio espectro, de acción bacteriostática, que actúa inhibiendo la síntesis proteica bacteriana.

INDICACIONES.- Infecciones del polo anterior del ojo (conjuntiva y/o córnea) causadas por gérmenes sensibles al cloramfenicol.

En infecciones severas la aplicación oftálmica deberá ser completada con la administración sistémica de un antibiótico adecuado.

POSOLOGÍA.- En general se instilarán 2 gotas en el ojo afectado cada 3 horas, o más frecuentemente durante las primeras 48 horas, pudiéndose aumentar posteriormente el intervalo entre las aplicaciones, siempre según criterio facultativo.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN.- Separar los párpados del ojo e instilar las gotas en el saco conjuntival.

Es conveniente que la aplicación del colirio se realice con pulcritud evitando cualquier contacto con el goteador.

Tapar el frasco después de cada aplicación.

Desechar al mes de abierto el envase.

CONTRAINDICACIONES.- Pacientes con hipersensibilidad al cloramfenicol. No se utilizará en recién nacidos ni en pacientes con antecedentes de insuficiencia medular. (Ver también Advertencias sobre excipientes).

PRECAUCIONES.- Debido a su potencial efecto tóxico sobre la médula ósea (véase Efectos Secundarios) no debe ser utilizado más que en casos de absoluta necesidad, en infecciones producidas por gérmenes sensibles a este antibiótico.

Asimismo no debe ser empleado de forma prolongada.

INTERACCIONES.- No debe asociarse su empleo con otros preparados de uso oftálmico conteniendo otro antibiótico o una sulfamida.

No debe administrarse con antibióticos bactericidas por la posibilidad de producirse un antagonismo.

EFFECTOS SECUNDARIOS.- Puede producir alteraciones en la médula ósea, fundamentalmente del tipo de aplasias medulares. La aplicación tópica del cloramfenicol está considerada como un factor favorecedor de las aplasias medulares, si se administra posteriormente por vía sistémica.

Pueden producirse reacciones de alergia que requerirán interrupción del tratamiento.

En tratamientos prolongados pueden aparecer sobreinfecciones producidas por microorganismos resistentes, en cuyo caso debe interrumpirse el tratamiento y aplicar la terapia adecuada. (Ver también Advertencias sobre excipientes).

INCOMPATIBILIDADES.- No se han descrito.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO.- Debido a las características de este preparado, destinado a uso tópico, no son de esperar fenómenos de intoxicación con el uso de la especialidad a las dosis recomendadas. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida.

CONSERVACIÓN.- Proteger de la luz. Antes de su primera apertura debe mantenerse en frigorífico. Una vez desprecintado el frasco y mientras se esté utilizando puede conservarse a temperatura ambiente.

PRESENTACIÓN.- Envase con 10 ml.
Con receta médica.

ADVERTENCIAS

Advertencias sobre excipientes:

Este medicamento, por contener tiomersal como excipiente puede causar daño renal.

Por contener ácido bórico y tetraborato sódico como excipiente está contraindicado en niños menores de 3 años.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

ALCON CUSÍ, S.A.
c/ Camil Fabra, 58
08320 El Masnou - Barcelona