



® COLIRCUSÍ NEOMICINA

COMPOSICIÓN CUANTITATIVA.- Cada ml contiene 3,5 mg de neomicina (sulfato).
Excipientes: parahidroxibenzoato de metilo, parahidroxibenzoato de propilo y agua purificada.

PROPIEDADES.- La neomicina es un antibiótico aminoglicósido, de acción bactericida, eficaz principalmente frente a microorganismos gramnegativos.

INDICACIONES.- Infecciones oculares causadas por gérmenes sensibles a la neomicina.

POSOLOGÍA.- En general se instilarán 2 gotas 3 veces al día.
El número de aplicaciones diarias y la duración del tratamiento podrá modificarse según criterio médico.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN.- Separar los párpados del ojo e instilar las gotas en el saco conjuntival.
Es conveniente que la aplicación del colirio se realice con pulcritud evitando cualquier contacto con el goteador.
Tapar el frasco después de cada aplicación.
Desechar al mes de abierto el envase.

CONTRAINDICACIONES.- No administrar a pacientes con hipersensibilidad conocida a la neomicina o a otros aminoglucósidos.
Los pacientes que fueran alérgicos a algún antibiótico, es conveniente que consulten al médico o farmacéutico antes de la administración de este medicamento.

EFFECTOS SECUNDARIOS.- Pueden producirse reacciones de alergia caracterizadas por alteraciones de la piel con picor, erupción cutánea o sarpullido (rash), inflamación y enrojecimiento u otros signos de irritación, inexistentes antes de la administración del colirio. En tales casos, debe interrumpirse el tratamiento y consultar al médico lo antes posible.
Con el uso de antibióticos puede aparecer crecimiento de microorganismos no susceptibles, en particular hongos, en cuyo caso se interrumpirá la medicación y se tomarán las medidas adecuadas.

INCOMPATIBILIDADES.- No se han descrito.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO.- Debido a las características de este preparado, destinado a uso tópico, no son de esperar fenómenos de intoxicación con el uso de la especialidad a las dosis recomendadas ni en caso de ingestión accidental del contenido de un envase.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN.- Aunque este medicamento no requiere especiales condiciones de conservación, debe observarse siempre la fecha de

caducidad del envase; una vez abierto, deberá usarse durante el periodo de tratamiento establecido por el médico. Finalizado dicho tratamiento deberá desecharse el medicamento aunque no se haya consumido en su totalidad. Esta advertencia es aplicable a todos los colirios y pomadas oftálmicas dado que, por tratarse de medicamentos estériles, tienen una duración muy limitada una vez abiertos.

PRESENTACIÓN.- Envase con 10 ml.
Con receta médica.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

ALCON CUSÍ, S.A.
c/ Camil Fabra, 58
08320 El Masnou - Barcelona