

Winstrol® Winstrol® Depot

Stanozolol



COMPOSICIÓN

- Winstrol comprimidos: Cada comprimido contiene: Stanozolol 2 mg, excipientes: Lactosa, Magnesio estearato, Calcio fosfato dibásico, Carboximetil almidón, Goma arábica, Colorante rojo (E127) y Agua desionizada c.s.
- Winstrol Depot: Cada ampolla de 1 ml contiene: Stanozolol 50 mg, excipientes: Sodio fosfato dibásico, Polisorbato 80, Sodio mertiolato, Sodio cloruro y Agua para inyección c.s.

PROPIEDADES

El principio activo es el Stanozolol, que es el 17-β-hidroxi-17-α-metil androstano (3,2-c) pirazol, anabolizante eficaz tanto por vía oral como parenteral y potente estimulante de la síntesis proteica. El efecto del fármaco (que en el caso de Winstrol Depot se prolonga durante 2 ó 3 semanas) se manifiesta con un aumento del apetito y del peso corporal y con una notable recuperación de las condiciones generales al mejorar la utilización de las proteínas.

INDICACIONES

- Estados de desmejoramiento general, delgadez de diverso origen, anorexia rebelde, convalecencia, enfermedades crónicas y debilitantes.
- Síndromes nefróticos, asmáticos, artritis reumatoide, etc., para contrarrestar el efecto catabólico de los cortisónicos.
- Como coadyuvante en el tratamiento de llagas de decúbito, fracturas de lenta consolidación, osteoporosis, quemaduras extensas, períodos pre y post-operatorio.
- En pediatría, en los retardos del crecimiento estatural y ponderal, en los hipoevolutismos somáticos, en las distrofias y en la inmadurez.

POSOLOGÍA

Winstrol comprimidos:

- Adultos: 1 comprimido dos o tres veces al día, antes o durante las comidas.
- Niños: Hasta los 2 años: 1/2 comprimido una vez al día.
De 2 a 6 años: 1/2 comprimido dos veces al día.

Winstrol Depot inyectable intramuscular:

- Adultos: 1 ampolla cada dos o tres semanas.
- Niños: Hasta los 2 años: 1/2 ampolla cada dos o tres semanas.
De 2 a 6 años: 1/2 - 1 ampolla cada dos o tres semanas, según juicio médico.

Winstrol Depot es una suspensión acuosa particularmente estudiada para una absorción prolongada ausente de efectos irritativos locales. Su uso es preferible siempre que el médico crea conveniente las administraciones parenterales distanciadas en el tiempo, más seguras o más idóneas que las diarias orales.

Agitar la ampolla antes de inyectarla.

Es oportuno integrar el tratamiento anabolizante con una dieta rica y equilibrada.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al Stanozolol. Embarazo. Carcinoma de próstata.

PRECAUCIONES

En pacientes sensibles a fenómenos colaterales endocrinos o hidro-electrolíticos (tendencia al edema), es oportuna una vigilancia periódica durante los tratamientos prolongados.

En pacientes con hepatopatías, se aconseja vigilar los índices de colestasis. Winstrol comprimidos contiene lactosa. Se han descrito casos de intolerancia a este componente en niños y adolescentes. Aunque la cantidad presente en el preparado no es, probablemente, suficiente para desencadenar los síntomas de intolerancia, en caso de que aparecieran diarreas debe consultarse al médico.

ADVERTENCIAS

Los esteroides anabólicos tienen la capacidad potencial de producir efectos masculinizantes, que pueden manifestarse en las niñas, por lo que, en estos casos, el tratamiento debe ser estrictamente vigilado por el médico. Los tratamientos muy prolongados para favorecer el crecimiento, deben ser interrumpidos cuando la edad esquelética (a controlar radiológicamente cada semestre) se acerque a la edad cronológica.

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de control de dopaje como positivo.

INTERACCIONES

La administración contemporánea de corticosteroides o ACTH puede provocar edema ocasionalmente. En tratamientos con anticoagulantes, se puede registrar un aumento de la respuesta a estos fármacos, por lo que puede ser necesario reducir su dosis para obtener el mismo efecto terapéutico.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Aunque muy raros y siempre reversibles, pueden aparecer: náuseas, vómitos, excitación, insomnio, acné.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

A las dosis terapéuticas indicadas, no cabe esperar ningún tipo de toxicidad aguda.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

PRESENTACIONES

Winstrol comprimidos: envases con 20 y 40 comprimidos.

Winstrol Depot inyectable: envases con 1 y 3 ampollas de 1 ml.

Con receta médica.

MANTENER LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS

425358-01

ZAMBON, S.A.
Sta. Perpètua de Mogoda
(Barcelona)

007040X
SV0504