

# Diazepam Prodes 10 mg Supositorios

## Diazepam

### Composición por supositorio:

Diazepam (DOE) ..... 10 mg  
Excipiente (Massa estarinum C)

### Indicaciones

Estados de ansiedad y tensión psíquica. Insomnio. Convulsiones. Cuadros de contractura muscular.

### Posología

Adultos y niños mayores: 5 a 10 mg por día.

Niños: 1/2 mg/kg - 2,5 a 5 mg por día.

Ancianos o sujetos débiles: 5 mg por día.

Según el tipo de proceso a tratar se puede incrementar la dosis hasta 20 mg por día (ej. contracturas musculares). En psiquiatría se utilizarán dosis superiores a criterio facultativo.

### Contraindicaciones

Miastenia gravis y glaucoma. Pacientes hipersensibles al diazepam. Se utilizará con precaución en los siguientes casos: insuficiencia renal y hepática, embarazo, lactancia y pacientes que conduzcan vehículos o manejen maquinaria peligrosa.

### Precauciones

Pacientes con antecedentes de abuso de fármacos psicoactivos.

### Incompatibilidades

Hipnóticos y opiáceos. Los efectos del diazepam pueden ser potenciados por el alcohol y otros depresores del SNC.

### Efectos secundarios

Se han descrito somnolencia, fatiga y ataxia; en raras ocasiones puede presentarse sequedad de boca, hipotensión, visión borrosa y erupciones cutáneas.

### Intoxicación y su tratamiento

Por vía rectal no es posible que se produzca una intoxicación con el preparado. Ante una ingesta masiva accidental se recomienda lavado gástrico y tratamiento sintomático.

\*En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 915 620 420\*.

### Riesgo de dependencia

El uso de benzodiazepinas puede inducir a una dependencia. Esto ocurre, principalmente, tras la toma de forma ininterrumpida del medicamento durante largo tiempo. Para prevenir al máximo este riesgo deben tenerse en cuenta estas precauciones:

- La toma de benzodiazepinas se hará sólo bajo prescripción médica (nunca porque hayan dado resultado en otros pacientes) y nunca aconsejarlas a otras personas.

- No aumentar, en absoluto, las dosis prescritas por el médico, ni prolongar el tratamiento más tiempo del recomendado.

- Consultar al médico regularmente para que decida si debe continuarse el tratamiento.

Al cesar la administración puede aparecer inquietud, ansiedad, insomnio, falta de concentración, dolor de cabeza y sudores. No se recomienda, en general, interrumpir bruscamente la medicación, sino reducir gradualmente la dosis, de acuerdo siempre con las instrucciones del médico.

### Presentación

Envase con 10 supositorios.

Texto revisado: Diciembre 1998

Mod. P.01 (20/02/03) C16/98

Con receta médica  
Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños



**Almirall Prodesfarma**

Almirall Prodesfarma, S.A. General Mitre, 151 - 08022 Barcelona (España)