

FUNGUSOL

Polvos desodorantes con acción preventiva ante infecciones por hongos y bacterias.

Existen ciertas situaciones y épocas con mayor riesgo de infecciones por hongos y bacterias: exceso de sudoración, uso de calzado cerrado y ropa de fibra no transpirables, uso de vestuarios y duchas comunes, piscinas, playas, moquetas, etc. En estas situaciones, el sudor produce el tipo de ambiente húmedo y caliente en el que las infecciones pueden desarrollarse.

FUNGUSOL disminuye el exceso de humedad en la piel por la acción del óxido de zinc, creando un medio adverso para el crecimiento de microorganismos, acción que se refuerza por el efecto antiséptico del ácido bórico. El aerosil que se incorpora en su fórmula facilita la adherencia de estos principios activos a la piel.

FUNGUSOL dificulta la descomposición microbiana del sudor, combatiendo el mal olor corporal.

COMPOSICION

Cada 100 g contienen: ácido bórico, 5 g; óxido de zinc, 10 g.

Excipientes: sílice coloidal anhidra, almidón de maíz, talco y esencia de Fleuri.

INDICACIONES

UTILIZAR ÚNICAMENTE SOBRE PIEL SANA.

Prevención de las infecciones, por hongos y bacterias, de la piel sana, principalmente en los pliegues cutáneos (interdigitales, ingles y axilas). Alivio sintomático de la sudoración excesiva y el mal olor corporal (principalmente de los pies) en personas que practican deporte, utilizan calzado cerrado y poco transpirable y se mueven en ambientes húmedos y calidos.

POSOLOGÍA

Después de lavar y secar muy bien la zona afectada espolvorear una o dos veces al día las zonas del cuerpo con mayor predisposición a sufrir excesos de sudoración y procesos infecciosos: pies (en especial los espacios interdigitales), axilas, ingles, pliegues cutáneos. También se aplicará en el interior de las prendas en contacto o próximos a dichas zonas (calzado, calcetines).

Niños: consultar al medico.

INCOMPATIBILIDADES

No se conocen.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes. No debe aplicarse sobre piel herida, ni sobre mucosas (ojos, oídos, nariz, boca y mucosa vaginal).

EFFECTOS SECUNDARIOS

Al aplicarse sobre zonas muy sensibles de la piel, en especial si están húmedas, puede notarse una inmediata sensación de picazón que cede con rapidez. En algunas ocasiones, irritaciones cutáneas.

PRECAUCIONES

No aplicar sobre zonas muy amplias de la piel.

En caso de agravación o persistencia de los síntomas, consultar al medico.

Para evitar contagios no debe compartir con otras personas, toallas, calcetines ni calzado. Evitar los pies descalzos en piscinas y baños colectivos.

INTOXICACIÓN

Sobre piel sana y a las dosis indicadas no deben producirse fenómenos de intoxicación.

Usado en grandes cantidades o de forma muy continuada o sobre piel lesionada o por ingestión accidental, pueden producirse fenómenos de intoxicación (nauseas, vómitos, diarreas, dermatitis descamativa, hipotensión y taquicardia). Acudir inmediatamente a un Centro Medico indicando el producto y cantidad ingerida.

En caso de sobredosis o ingestión accidental consultar al Servicio de Información Toxicológica, TEL. 91 562 04 20.

PRESENTACIÓN

Frasco de 60 g.

TITULAR
QUÍMICA FARMACÉUTICA BAYER, S.A.
Pau Claris 196
08037 Barcelona

FABRICANTE
KERN PHARMA, S.L.
Polígono Industrial Colon, II
Venus, 72
08228 - TERRASSA

SIN RECETA MEDICA.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.