

Vitiligo

Pimecrolimus en crema en la repigmentación del vitiligo

El vitiligo es un trastorno crónico de la pigmentación cutánea en el que se produce una desaparición de los melanocitos. Tiene una prevalencia de alrededor del 1-2% en la población general, afectando principalmente a niños y adultos jóvenes. Actualmente hay un amplio arsenal terapéutico, pero en la mayoría de los casos producen efectos indeseables.

Se evaluó una crema de pimecrolimus al 1% en 30 pacientes con lesiones de vitiligo en menos del 20% de la superficie corporal y sin ningún historial previo de repigmentación espontánea. Se les administró la crema dos veces al día durante 12 semanas y se evaluaron los resultados a las 6 y 12 semanas de tratamiento.

Los resultados mostraron una repigmentación de las lesiones de vitiligo del 6,6% y del 25,9% a las 6 y 12 semanas, respectivamente. Las respuestas más positivas se produjeron en las lesiones del tronco, de la cara y de los codos.

Los autores concluyeron que son necesarios nuevos estudios doble ciego y placebo-controlados para probar de forma clara la eficacia de pimecrolimus, tanto en monoterapia como en combinación con otros tratamientos.

- Seirafi H, Farnaghi F, Firooz A, et al. Pimecrolimus cream in repigmentation of vitiligo. *Dermatology*. 2007; **214(3)**: 253-9.