

## **Sildenafil en eyaculación precoz**

Recientemente sildenafil ha demostrado ser eficaz frente a la eyaculación precoz primaria (EPP). Sin embargo, anteriores estudios no han tenido en cuenta diversos factores relacionados con la mujer, y tampoco pudieron excluir las posibles interacciones con otro medicamento utilizado para esta patología: la paroxetina.

En este último ensayo, se han tenido en cuenta todos estos factores y la eficacia del sildenafil en 180 hombres con EPP. Se dividieron en tres grupos y se realizó un seguimiento durante seis meses. Un grupo se trató con 50 mg de sildenafil, otro con 20 mg de paroxetina y el último grupo fue tratado mediante técnicas de estrangulamiento del pene.

Las variables de estudio fueron el tiempo de latencia intravaginal, que es el periodo de tiempo transcurrido entre la penetración vaginal y la eyaculación, resultado de coitos satisfactorios, frecuencia de coitos y efectos adversos.

El grupo tratado con sildenafil mostró diferencias significativas respecto a los otros dos grupos de tratamiento en todos los parámetros estudiados; hubo un menor número de abandonos y presentó mayor porcentaje de pacientes que querían continuar con el tratamiento una vez terminado el estudio.

- **Wang WF, Wang Y, Minhas S, et al.** Can sildenafil treat primary premature ejaculation? A prospective clinical study. *Int J Urol.* 2007; **14(4)**: 331-5.