

# CINARIZINA RATIOPHARM 75 mg cápsulas

ratiofarm

VIA ORAL

## COMPOSICIÓN

Cada cápsula contiene:

Cinarizina, 75 mg

Excipientes: Celulosa microcristalina, Estearato de magnesio.

## PROPIEDADES

La cinarizina ejerce una acción antagonista de la entrada de los  $\text{Ca}^{2+}$  a través de la membrana de la célula muscular lisa, que se traduce por una acción antivasoconstrictora de las fibras musculares lisas de los vasos cerebrales y periféricos.

Su acción depresora de la irritabilidad laberíntica hace a la cinarizina selectiva en el síndrome vertiginoso.

## INDICACIONES

- Trastornos del equilibrio, vértigo de origen central o periférico.
- Profilaxis de las cefaleas vasculares (jaquecas, migraña).
- A dosis inferiores, prevención del mareo cinético.

## POSOLOGÍA

Dosis media recomendada: Adultos 75 mg (una cápsula) dos veces al día.

## CONTRAINDICACIONES

- No debe administrarse a pacientes con enfermedad de Parkinson o con sintomatología extrapiramidal.
- Fase aguda de ictus cerebral.

## EFEKTOS SECUNDARIOS

Puede producir somnolencia, molestias digestivas, fatiga, reacciones cutáneas y efectos anticolinérgicos (sequedad de boca, visión borrosa, etc.). Tras el tratamiento prolongado puede aparecer sintomatología extrapiramidal (parkinsonismo, discinesias, acatisia, etc.).

## ADVERTENCIAS

La cinarizina puede causar somnolencia, por lo que deberán tener precaución las personas que deban conducir vehículos o manejen maquinaria peligrosa.

La seguridad del empleo de cinarizina en mujeres embarazadas no ha sido establecida. Aunque los estudios en animales de experimentación no han mostrado efectos teratogénicos, se recomienda no administrar el fármaco durante este período.

Se desaconseja el consumo de bebidas alcohólicas durante el tratamiento.

## INTERACCIONES

Puede potenciar el efecto sedante de los depresores del Sistema Nervioso Central (alcohol, barbitúricos, etc.) así como el efecto y/o toxicidad de anticolinérgicos y antidepresivos tricíclicos.

## PRECAUCIONES

- Deberá emplearse con cuidado en pacientes con glaucoma e hipertrofia prostática.
- Si aparecieran síntomas extrapiramidales debe suspenderse inmediatamente el tratamiento.

## **INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO**

No existen antídotos específicos. En caso de ingestión masiva accidental se recomienda lavado gástrico y tratamiento sintomático habitual.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20.

## **PRESENTACION**

Cinazina ratiopharm 75: Envase con 30 cápsulas.

## **CON RECETA MEDICA**

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE  
FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS**

RATIOPHARM ESPAÑA, S.A.  
C/ Rosario Pino 14-16 – 28020 MADRID