

Prospecto

Gamalate B₆ grageas

COMPOSICIÓN

Por gragea:

Bromhidrato de α -amino glutamato de magnesio (BGM) 75 mg; Ácido γ -amino-butírico (GABA) 75 mg; Ácido γ -amino β -hidroxibutírico (GABOB) 37 mg; Piridoxina clorhidrato 37 mg.

Excipiente: Sacarosa 210 mg aprox.; Sílice coloidal; Polivinilpirrolidona; Carboximetilalmidón; Estearato de magnesio; Talco; Almidón de maíz; Dióxido de titanio; Carbonato magnésico; Indigotina; Eudrait E; Goma arábiga; Propilenglicol y Cera de Carnauba.

INDICACIONES

Disminución del rendimiento intelectual en el niño.

Trastornos de la conducta (hiperactividad) en niños con déficit intelectual ligero o moderado.

Disminución del rendimiento intelectual en el adulto

Síntomas somáticos de la ansiedad.

DOSIS Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

2 grageas, 2 ó 3 veces al día, antes o después de las principales comidas.

Dada la perfecta tolerancia del preparado, estas dosis pueden aumentarse sin peligro alguno, según el criterio facultativo.

CONTRAINDICACIONES, EFECTOS SECUNDARIOS E INCOMPATIBILIDADES

No deberá ser utilizado en sujetos con úlcera péptica en fase activa, ni en pacientes que hayan mostrado Gamalate no presenta contraindicaciones, efectos secundarios, ni incompatibilidades.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

Dada la escasa toxicidad del preparado no se prevé la intoxicación, ni aún la accidental.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

PRESENTACIÓN

Envase con 60 grageas.

OTRAS PRESENTACIONES

Gamalate solución. Envases conteniendo 80 ml de solución.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.

Laboratorios Novag, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028 Barcelona (España)

Dir. Técnico: J.M. Gil Aroca