

**Redoxc® 1.000 mg Efervescente
Sabor Naranja**

Vitamina C (ácido ascórbico)

COMPOSICIÓN

Cada comprimido de Redoxc 1.000 mg Efervescente Sabor Naranja contiene: 1.000 mg de vitamina C (= ácido ascórbico) (DCI), Bicarbonato sódico, Acido cítrico anhidro, Carbonato sódico anhidro, Acido málico, Isomaltosa, Cloruro sódico, Acesulfamo potásico, Aspartamo, Aroma de naranja Ultraseal 97363-51 Givaudan, Aroma de mandarina Permaseal 84279-B Givaudan, Beta - caroteno 1% CWS.

PROPIEDADES GENERALES

El organismo humano necesita diariamente la vitamina C (ácido ascórbico) a todas las edades. Esta vitamina es de gran importancia puesto que interviene en numerosos procesos del organismo, particularmente en relación con la formación de colágeno, la proteína que constituye la membrana basal de los capilares, las fibras del tejido conjuntivo y la matriz orgánica de los tejidos duros, como el hueso y el diente.

INDICACIONES

Prevención de estados carenciales de vitamina C.

Aunque la dieta habitual es rica en ácido ascórbico y cubre las necesidades de esta vitamina, sin embargo en algunos casos como úlcera péptica, hipertiroidismo, diarrea crónica, embarazo, tabaquismo, uso de anticonceptivos hormonales y estados de malnutrición que no pueden corregirse con la dieta (ej. pacientes bajo regímenes dietéticos), puede ser necesario un mayor aporte de vitamina C.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Como norma general se tomará un comprimido una vez al día, preferentemente por la mañana o a primeras hora de la tarde (hasta el anochecer).

Déjese disolver el comprimido efervescente en un vaso de agua y se obtendrá una bebida de agradable sabor a naranja. Nunca se tomará el comprimido directamente, sin disolverlo.

CONTRAINDICACIONES

En condiciones normales no necesita administrarse, en el embarazo, dosis superiores a los 100 mg al día y, en cualquier caso, siempre por indicación del médico. Aunque no hay evidencia de efectos perjudiciales, la seguridad fetal de las dosis altas de vitamina C no ha sido establecida.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Las dosis superiores a 1 g por día pueden producir diarrea, cálculos renales y calambres abdominales.

Asimismo existe el riesgo de formación de cálculos y de precipitar ataques agudos de gota en individuos predispuestos.

INTERACCIONES

La vitamina C en dosis, puede modificar la acción de ciertos medicamentos.

Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando antidepresivos, anticoagulantes, dosis altas de salicilatos, sulfamidas, trimetoprim/sulfametoxazol o anticonceptivos hormonales.

PRECAUCIONES

- No deben tomarse dosis altas en el embarazo (Ver apartado de CONTRAINDICACIONES).
- Los pacientes con historia de formación de cálculos o gota deberán consultar a su médico antes de tomar este medicamento.

ADVERTENCIA

Las pruebas de glucosa en orina, incluyendo las pruebas por tiras reactivas pueden dar resultados erróneos.

Advertencia sobre excipientes

Este medicamento por contener 312 mg de sodio por comprimido efervescente puede ser perjudicial en pacientes con dietas pobres en sodio.

Este medicamento contiene como excipiente Aspartamo. Las personas afectadas de fenilcetonuria tendrán en cuenta que cada comprimido efervescente del mismo contiene 11,2 mg de fenilalanina.

CONSERVACIÓN

Conservar el envase bien cerrado, en lugar fresco y seco.

SOBREDOSIS

En caso de ingestión accidental de grandes cantidades, acuda al médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

PRESENTACIÓN

Envase con un tubo de 15 comprimidos efervescentes, de 1.000 mg con sabor a naranja.

Envase con dos tubos de 15 comprimidos efervescentes, de 1.000 mg con sabor a naranja.

Otras presentaciones de Redoxc:

- Envase con 20 comprimidos masticables de 500 mg
- Envase con 20 ml de solución gotas (1 ml = 200 mg)
- Envase con un tubo de 15 comprimidos efervescentes de 1.000 mg con sabor a limón.
- Envase con dos tubos de 15 comprimidos efervescentes de 1.000 mg con sabor a limón.

IMPORTANTE PARA LA MUJER

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

**Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
Sin receta médica.**

TITULAR

BAYER HISPANIA, S.L.
Av. Baix Llobregat, 3-5
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

FABRICANTE

BAYER SANTE FAMILIALE
33, rue de l'Industrie
74240 GAILLARD (Francia)