



## CAPSICUM FARMAYA CREMA Oleorresina de Capsicum

### COMPOSICIÓN POR 100 MG:

Principio activo:

Oleorresina de Capsicum annum (valorado en capsaicina): 0.025 g

Excipientes: Monoestearato de polietilenglicol, Monoestearato de glicerina, Acido estearico, Alcohol oleico, Alcohol cetílico, Propilenglicol, Miristato de isopropilo, Metilparaben, Propilparaben, Agua desionizada.

### FORMA FARMACEUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE:

Crema de aplicación tópica dermatológica.

Envase de 15 y 30 gramos

### ACTIVIDAD:

Su aplicación tópica produce acción rubefaciente, sensación transitoria de ardor, seguida de una progresiva disminución del dolor localizado en la piel y tejidos subyacentes al lugar de aplicación.

### Titular y fabricante

Fabricante: ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS CENTRUM, S.A.

C/ Sagitario, 14

03006 - Alicante

Titular: ALACAN, S.A.

C/Capricornio 5.

03006 Alicante

### INDICACIONES:

Alivio sintomático de dolores musculares o articulares localizados.

### Contraindicaciones

Esta especialidad es de uso exclusivamente tópico, sobre la piel, y debe evitarse su aplicación sobre la piel irritada, quemada o herida, así como sobre los ojos y mucosas.

Antecedentes de alergia a sus componentes.

No utilizar en niños menores de 2 años.

### PRECAUCIONES:

Si los dolores persisten más de 7 días o empeoran, o se produce irritación o empeoramiento, consultar a su médico o farmacéutico.

No aplicar calor ni vendajes apretados.

No utilizar de forma prolongada ni en áreas extensas.

### INTERACCIONES:

No utilizar junto con otros preparados tópicos sin consultar con el médico.

### ADVERTENCIA:

**Embarazo y lactancia:** Consulte a su médico antes de utilizarlo.

**Uso en niños:** Consulte a su médico antes de utilizarlo.

**Efectos sobre la capacidad de conducción:** No se han descrito.

### POSOLOGÍA:

Uso exclusivamente local, sobre la piel. Aplicar una fina capa de producto sobre la zona afectada, extendiéndola suavemente. Repetir la aplicación 3 ó 4 veces al día.

### INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO:

Conviene lavarse las manos con agua fría y jabón inmediatamente después de cada aplicación, así como evitar el contacto con ojos y mucosas. (En caso de producirse, lavar inmediatamente con abundante cantidad de agua y acudir a un centro médico)

### SOBREDOSIS:

En caso de ingestión accidental, acudir a un centro médico o llamar al Servicio de Toxicología Telf. 91 562 04 20 indicando el producto y la cantidad ingeridos.

### REACCIONES ADVERSAS:



El principal efecto secundario es la reacción de ardor inicial que se produce tras la aplicación del producto. Esta reacción suele disminuir con el tiempo a medida que prosigue el tratamiento, a la dosis recomendada. En algunas personas, reacciones alérgicas (quemazón o picor). En éste caso suspender el tratamiento.

"Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico"

**CONSERVACIÓN:**

Lugar fresco y seco /temperatura inferior a 30)

**CADUCIDAD:**

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

**TEXTO REVISADO:**

**NOVIEMBRE - 1999**

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**