

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a Usted personalmente y no debe darlo a otras personas. Puede perjudicarles, aun cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

En este prospecto:

- 1. Qué es AMOXICILINA ARDINE 500 mg Cápsulas y para qué se utiliza**
- 2. Antes de tomar AMOXICILINA ARDINE 500 mg Cápsulas**
- 3. Cómo tomar AMOXICILINA ARDINE 500 mg Cápsulas**
- 4. Posibles efectos adversos**
- 5. Conservación de AMOXICILINA ARDINE 500 mg Cápsulas**

AMOXICILINA ARDINE 500 mg Cápsulas EFG

Cada cápsula contiene:

Amoxicilina (trihidrato) 500 mg

Los demás componentes (excipientes) son: estearato magnésico y glicolato sódico de almidón, c.s.

Los componentes de la cápsula son: gelatina, laurilsulfato sódico, amarillo de quinoleína, azul patentado V, bióxido de titanio, shellac, óxido de hierro negro y lecitina de soja, c.s.

Titular y responsable de la fabricación:

REIG JOFRÉ, S.A.

c/ Gran Capità, 10

08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

1. QUÉ ES AMOXICILINA ARDINE 500 mg CÁPSULAS Y PARA QUÉ SE UTILIZA

AMOXICILINA ARDINE 500 mg Cápsulas se presenta en un envase con 20 ó 30 cápsulas.

AMOXICILINA ARDINE es un antibiótico perteneciente al grupo de las penicilinas. AMOXICILINA ARDINE está indicado para el tratamiento de las infecciones producidas por gérmenes sensibles a amoxicilina:

- Infecciones de la garganta, nariz, oídos
- Infecciones de las vías respiratorias bajas, tanto de los bronquios como de los pulmones
- Infecciones genito-urinarias, es decir, infecciones de la vejiga, de la orina y de la uretra
- Infecciones de la piel y tejidos blandos, incluyendo infecciones de la herida quirúrgica
- Infecciones dentales
- Fiebre tifoidea y paratifoidea
- Infecciones del tracto biliar
- Borreliosis o enfermedad de Lyme, enfermedad infecciosa que se caracteriza por fiebre elevada, dolores de cabeza y dolores musculares
- Erradicación de *Helicobacter pylori*, bacteria implicada en alteraciones gastrointestinales y que contribuye a la aparición de la úlcera gástrica, en asociación con otros medicamentos
- Profilaxis de la inflamación cardiaca (endocarditis), en caso de intervención o extracción dental

2. ANTES DE TOMAR AMOXICILINA ARDINE 500 mg CÁPSULAS

No tome AMOXICILINA ARDINE 500 mg Cápsulas:

Si es alérgico a las penicilinas, a las cefalosporinas, o a cualquier otro componente de la formulación.

Si tiene una enfermedad denominada mononucleosis infecciosa.

Tenga especial cuidado con AMOXICILINA ARDINE 500 mg Cápsulas:

Si después de tomar el medicamento se produjera alguna reacción alérgica. En este caso, suspenda el tratamiento y acuda a su médico lo antes posible.

AMOXICILINA ARDINE se debe emplear con precaución en pacientes con problemas en el hígado o en el riñón.

Si está en tratamiento con anticoagulantes orales.

Si durante el tratamiento aparece algún episodio de diarrea intensa, acompañado de náuseas, vómitos, fiebre y/o calambres abdominales, deberá suspenderse éste inmediatamente.

Si aparecen crisis convulsivas.

Toma de AMOXICILINA ARDINE 500 mg Cápsulas con los alimentos y bebidas:

Es preferible tomar este medicamento con las comidas, sin embargo, también es activo si se toma sin alimentos.

Embarazo y Lactancia

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento. Su médico valorará la necesidad de emplear este medicamento.

Toma o uso de otros medicamentos:

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, o ha utilizado recientemente, cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica, homeopáticos, plantas medicinales y otros productos relacionados con la salud, ya que puede ser necesario interrumpir el tratamiento o ajustar la dosis de alguno de ellos.

Algunos medicamentos pueden reducir o aumentar el efecto de AMOXICILINA ARDINE si se toman conjuntamente.

No se debe tomar junto con otros antibióticos del grupo de las tetraciclinas o del cloranfenicol.

No se debe tomar con probenecid.

No debe administrarse junto a un medicamento para el tratamiento de la gota (alopurinol), porque pueden aparecer problemas cutáneos.

Comunique a su médico que está tomando este medicamento, ya que puede alterar los resultados de un análisis de sangre.

3. CÓMO TOMAR AMOXICILINA ARDINE 500 mg CÁPSULAS:

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas. En estos casos es conveniente solicitar al médico las instrucciones por escrito y asegurarse de haberlas entendido bien.

Recuerde tomar su medicamento.

Su médico le indicará la duración de su tratamiento con AMOXICILINA ARDINE 500 mg Cápsulas. No suspenda el tratamiento antes, ya que la infección podría reaparecer.

Este medicamento deberá administrarse por vía oral según las instrucciones recibidas de su médico.

AMOXICILINA ARDINE 500 mg Cápsulas está especialmente indicado en adultos y niños de más de 40 kg. La posología habitual es de 1 cápsula cada 8 horas.

Para el tratamiento de infecciones por *Helicobacter pylori*: 2-3 g al día, junto con otros medicamentos para el tratamiento de la úlcera y a otros antibióticos, durante 14 días.

En el tratamiento de la cistitis simple en la mujer se recomienda una dosis única de 3 g.

Si estima que la acción de AMOXICILINA ARDINE 500 mg Cápsulas es demasiado fuerte o débil, comuníquesele a su médico o farmacéutico.

Instrucciones para la correcta administración del preparado

La cápsula se puede tomar con agua o zumos.

Si usted toma más AMOXICILINA ARDINE 500 mg Cápsulas del que debiera:

Si usted ha tomado más AMOXICILINA ARDINE 500 mg Cápsulas de lo que debe, puede tener molestias abdominales como náuseas, vómitos o diarrea. Consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 5620420.

Si olvidó tomar AMOXICILINA ARDINE 500 mg Cápsulas:

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si olvida tomar una dosis, tome la siguiente lo antes posible y continúe como hasta ese momento.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, AMOXICILINA ARDINE 500 mg Cápsulas puede tener efectos adversos.

Los siguientes efectos adversos son muy raros y pueden producirse en menos de 1 de cada 10.000 personas que utilizan AMOXICILINA ARDINE 500 mg Cápsulas:

- Signos repentinos de alergia, como erupción, picor o ampollas en la piel, hinchazón de la cara, labios, lengua u otras partes del cuerpo, o dificultad para respirar. Si se producen estos síntomas, interrumpa el tratamiento y consulte a su médico inmediatamente
- Reacciones cutáneas, posiblemente en forma de manchas rojas que pueden producir picor y ser similares a la erupción del sarampión. Las manchas pueden tener forma de ampolla o simplemente de manchas rojizas con el centro pálido. Estos síntomas pueden estar acompañados de fiebre
- Efectos relacionados con el hígado. Pueden aparecer en forma de náuseas, vómitos, pérdida de apetito, malestar general, fiebre, picor, coloración amarillenta de piel y ojos, y orina de color oscuro. Estos efectos hepáticos pueden aparecer hasta 2 meses después de tomar el medicamento
- Fiebre, dolor de las articulaciones, erupciones cutáneas, hinchazón de los ganglios linfáticos
- Efectos relacionados con el sistema digestivo, como diarrea grave, que también puede ser sanguinolenta y puede estar acompañada de cólicos
- Enfermedad del riñón – problemas al orinar, que puede ser dolorosa y sanguinolenta
- Falta de glóbulos blancos, que puede dar lugar a cansancio, dolores de cabeza, dificultad para respirar al hacer ejercicio, mareos, palidez y coloración amarillenta de la piel y/o los ojos
- Pueden producirse convulsiones en pacientes con la función renal alterada o que reciben altas dosis

Los siguientes efectos son frecuentes y pueden producirse en más de 1 de cada 100 y menos de 1 de cada 10 personas que utilizan AMOXICILINA ARDINE 500 mg Cápsulas:

- Diarrea, náuseas, indigestión
- Erupción cutánea

Los siguientes efectos son poco frecuentes y pueden producirse en más de 1 de cada 1.000 y menos de 1 de cada 100 personas que utilizan AMOXICILINA ARDINE 500 mg Cápsulas:

- Vómitos

Los síntomas anteriores frecuentes y poco frecuentes relacionados con el aparato digestivo son generalmente leves y pueden evitarse tomando su medicamento al inicio de las comidas. Si estos síntomas se agravan, consulte a su médico.

Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE AMOXICILINA ARDINE 500 mg CÁPSULAS

Mantenga AMOXICILINA ARDINE 500 mg Cápsulas fuera del alcance y de la vista de los niños.

No conservar a temperatura superior a 25 °C. Conservar protegido de la humedad.

Caducidad:

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Otras presentaciones:

AMOXICILINA ARDINE 500 mg Comprimidos: envases de 20 y 30 unidades

AMOXICILINA ARDINE 1 g Comprimidos: envases de 20 y 30 unidades

AMOXICILINA ARDINE 500 mg Polvo para suspensión oral: envases de 20 y 30 unidades

AMOXICILINA ARDINE 1 g Polvo para suspensión oral: envases de 20 y 30 unidades

AMOXICILINA ARDINE 125 mg/5 ml Suspensión oral: frascos de 120 ml

AMOXICILINA ARDINE 250 mg/5 ml Suspensión oral: frascos de 40 y 120 ml

Este prospecto ha sido aprobado en Julio 2015