



PROSPECTO

ZIPYRAN PLUS SABOR

Comprimidos Vía oral

COMPOSICION:

Cada comprimido contiene:

Prazicuantel	50 mg
Pirantel (embonato)	50 mg
Febantel	150 mg
Excipiente c.s.p.....	1 comprimido

INDICACIONES:

Tratamiento de las principales parasitosis intestinales de perros producidas por los siguientes parásitos:

Toxocara canis, *Toxascaris leonina*.

Uncinaria stenocephala, *Ancylostoma caninum*.

Trichuris vulpis.

Echinococcus granulosus, *Taenia hydatigena*, *Dipylidium caninum*.

ESPECIES DE DESTINO:

Perros.

DOSIS, MODO Y VIA DE ADMINISTRACIÓN:

En general la posología es de 5 mg de Prazicuantel, 5 mg de Pirantel (embonato) y 15 mg de Febantel por Kg p.v. (equivalente a 1 comprimido/10 Kg p.v.).

Dosis orientativas:

Cachorros y perros pequeños:

1/2 - 2 Kg p.v. : 1/4 comprimido

2 - 5 Kg p.v. : 1/2 comprimido

5 - 10 Kg p.v. : 1 comprimido

Perros medianos:

10 - 20 Kg p.v.: 2 comprimidos

20 - 30 Kg p.v.: 3 comprimidos

Perros grandes:

30 - 40 Kg p.v.: 4 comprimidos

No es necesario sobrepasar los 4 comprimidos en perros que pesen más de 40 Kg.

Para la desparasitación rutinaria del perro es necesario un único tratamiento. Este será repetido cada tres meses como control rutinario. En zonas con alto riesgo de infestación puede administrarse una dosis repetida a los 14 días del primer tratamiento. Esta repetición de tratamiento es necesaria especialmente en zonas donde no hayan sido eliminados los huéspedes intermedios tales como pulgas, ratones etc.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar a animales extremadamente debilitados.

No usar durante las cuatro primeras semanas de la gestación.

INTERACCIONES:

No administrar con fármacos colinérgicos o con propiedades anticolinérgicas, ya que pueden potenciar su toxicidad.

No administrar simultáneamente con compuestos de la piperazina.

REACCIONES ADVERSAS:

Las reacciones adversas de presentación más frecuente fueron anorexia, letargo, diarrea y vómitos.

SOBREDOSIFICACIÓN:

Dosis superiores a 4 veces la dosis terapéutica pueden producir: trastornos digestivos (náuseas, cólicos, diarreas) que deberán someterse a observación veterinaria.

PRECAUCIONES PARTICULARES DE USO:

Para evitar nuevas reinfestaciones, limpiar los locales y no administrar despojos descontrolados a perros.

Es recomendable administrar el tratamiento inmediatamente antes de la comida.

Se puede administrar directamente al animal o triturado y mezclado con el alimento.

No se necesita ayuno o un régimen alimenticio específico.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD QUE HA DE TOMAR LA PERSONA QUE ADMINISTRE O MANIPULE EL PRODUCTO:

Mantener fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES ESPECIALES QUE DEBAN OBSERVARSE PARA ELIMINAR EL MEDICAMENTO NO UTILIZADO Y/O LOS ENVASES:

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes.

TIEMPO DE ESPERA:

No procede.

CONSERVACIÓN:

No conservar a temperatura superior a 25° C

PRESENTACIONES:

Caja con 1 blister de 2 comprimidos

Caja con 1 blister de 6 comprimidos

Caja con 1 blister de 10 comprimidos

Caja con 2 blister de 10 comprimidos

Caja con 10 blister de 10 comprimidos

Caja con 25 blister de 10 comprimidos

De uso veterinario –Medicamento sujeto a prescripción veterinaria-

LABORATORIOS CALIER, S.A.

C/ Barcelonés, 26 (Pla del Ramassá)

LES FRANQUESES DEL VALLES (Barcelona)